

LES COLÉOPTÈRES DE L'ARDÈCHE : INVENTAIRE COMMENTÉ DES ESPÈCES

par
Henri Pierre Aberlenc

(Version provisoire du 6 septembre 2011)

Avertissement

Après la mention du nom de genre, le **numéro de page gras** entre () renvoie à l'ouvrage de Balazuc (1984), sauf pour la partie *Chrysomelidae*, qui renvoie à la pagination de notre *Premier supplément* (Aberlenc, 1987). Consulter également le *Second supplément* (Aberlenc, 1996). Nous ne mentionnons les synonymes que pour faciliter les recherches si ces taxons périmés ont été utilisés dans l'une ou l'autre de ces trois publications.

* Les espèces marquées d'une (†) sont connues d'un seul exemplaire et (ou) n'ont plus été retrouvées en Ardèche depuis de nombreuses années : il est très vraisemblable qu'elles soient éteintes en Ardèche.

Total = **5 espèces**

Campalita maderae indagator F., 1787

Catops bonadonai (Catopidae),

Gymnopleurus sturmi (Scarabaeidae),

Akis bakarozzo (Tenebrionidae)

Paramaurops abeillei (Saulcy, 1875) (Staphylinidae Pselaphinae).

+ Histérides et autres copros

Il est malheureusement vraisemblable qu'il faudra placer d'autres espèces dans cette rubrique : chers Collègues, je compte sur votre collaboration !

* Les espèces entre crochets sont soit connues de départements frontaliers de l'Ardèche, soit leur présence y est vraisemblable pour diverses raisons (plante-hôte, répartition géographique globale, biotope, etc.). Leur présence, très probable, doit cependant être confirmée.

Total = **120 espèces.**

* les espèces signalées par une astérisque sont présentes en Ardèche :

Total = **2880 espèces.**

TOTAL GÉNÉRAL ACTUEL = 2994 espèces.

Environ 11500 espèces de Coléoptères étant recensées en France, cela représente environ **26 % du total, ce qui est remarquable.**

Aux utilisateurs de la présente liste :

1°) Vous pouvez utiliser les données de cette liste comme bon vous semble. Ayez la gentillesse de nous citer et de nous envoyer une copie de votre travail.

2°) Si vous constatez des erreurs ou des omissions dans la présente version ou si des changements de nomenclature s'imposent, n'hésitez pas à nous les signaler !

Les Collègues qui ont transmis les informations sont désignés par leurs initiales placées entre parenthèses – **Chacun assume la responsabilité des données dont il est la source :**

Henri-Pierre ABERLENC (H.P.A.), Roland ALLEMAND (R.A.), Laurence ARVANITAKIS (L.A.), Pierre BERGER (P.B.), Jean-Claude BOURDONNÉ (J.C.B.), H. BOUYON (H.B.), Philippe BRUNEAU de MIRÉ (P.B.D.M.), J. COFFIN (J.C.), Gérard DELVARE (G.D.), Florence DESANGIN (F.D.), Michel DESCHANEL (M.D.), C. DUFAY (C.D.), Yves GOMY (Y.G.), Jean-François HOLTHOF (J.F.H.), Jean LAMBELET (J.L.), F. LECHANTEUR (F.L.), Jean-Claude LECOQ (J.C.L.), Philippe LENTENOIS (P.L.), L. LESEIGNEUR (L.L.), G. LISKENNE (G.L.), J.-M. MALDÈS (J.M.M.), S. PIRY (S.P.), A. SADORGE (A.S.), R. SAUCE (R.S.), Michel SECQ (M.S.) & Roger VINCENT (R.V.).

Remarques sur la nomenclature utilisée :

1°) Pour alléger la liste, les synonymes ne sont mentionnés que s'ils ont été utilisés dans le Balazuc ou dans nos Suppléments 1 & 2.

2°) Quand la sous-espèce est mentionnée, nous citons **volontairement** l'auteur et la date de description de l'espèce et de la sous-espèce.

3°) Quand aucune révision récente de la nomenclature d'une famille n'est disponible, nous conservons celle de Balazuc et de nos deux suppléments.

ADEPHAGA**CARABOIDEA****Cicindelidae**

Cicindela L., 1758 (**page 49**)

- * *C. (C.) campestris* L., 1758
- * *C. (C.) hybrida* L., 1758
- * *C. (C.) maroccana* F., 1801 subsp. *pseudomaroccana* (Roeschke)
- * *C. (C.) sylvicola* Dejean, 1822

Lophyra Motschulsky, 1859

- * *L. flexuosa* (F., 1787)

Carabidae

Calosoma Weber, 1801 (**page 33**)

- * *C. inquisitor* (L., 1758)
- * *C. sycophanta* (L., 1758)

Campalita Motschoulsky, 1865

- (†) *C. maderae* (Fabricius, 1775) subsp. *indagator* F., 1787

Lagorce : Sigaud (P.L.).

Carabus (*Autocarabus*) (**page 34**)

- * *A. auratus* L., 1761
- * *A. cancellatus* Illiger, 1798

Carabus (*Carabus*) L., 1758

- * *C. arvensis* Herbst, 1784

Carabus (*Eurycarabus*)

- * *E. monilis* F., 1792

Carabus (*Tomocarabus*) (**page 39**)

- * *T. convexus* (F., 1775)

Carabus (*Archicarabus*)

- * *O. (A.) nemoralis* (Müller, 1764)

Bois Sauvage (M.D. & P.L.) : localité remarquable par sa localisation géographique en Basse-Ardèche calcaire. Cette population ne diffère pas morphologiquement de celles que l'on trouve à plus haute altitude.

Carabus (*Mesocarabus*) (**page 40**)

- * *M. problematicus* (Herbst, 1786)

Carabus (*Procrustes*) Bonelli, 1810

* *P. coriaceus* (L., 1758)

Carabus (Megodontus) Solier, 1848 (**page 41**)

* *M. violaceus* subsp. *purpurascens* (F., 1787)

Carabus (Chaetocarabus) Thomson, 1875

* *C. intricatus* (L., 1761)

Vallée du Doux à 7 km de Tournon, altitude 350 m, une femelle le 31 octobre 1999 (L.A.). Nouvelle citation d'une localité classique.

Carabus (Chrysocarabus) Thomson, 1875 (**page 42**)

* *C. (Chrysotribax) hispanus* (F., 1792)

Bois Sauvage (P.L.). C'est une remarquable localité en basse-Ardèche calcaire (130 m). Si certains individus sont nains, cette population ne se distingue cependant pas de celles des Cévennes. Nous invitons nos collègues à respecter ces populations isolées, situées dans un biotope appelé à devenir une Réserve Biologique Domaniale, alors qu'ils peuvent trouver en abondance les mêmes espèces à plus haute altitude, dans leur aire de répartition classique.

* *C. (Chrysocarabus) auronitens* (F., 1792)

Cychrus F., 1794 (**page 44**)

* *C. caraboides* (L., 1758)

* *C. attenuatus* (F., 1792)

Leistus Froehlig, 1799

* *L. (Pogonophorus) spinibarbis* (F., 1775)

* *L. (P.) montanus* Stephens, 1828

* *L. (L.) fulvibarbis* Dejean, 1826

* *L. (L.) nitidus* Duftschmid, 1812

* *L. (L.) ferrugineus* (L., 1758)

Nebria Latreille, 1802 (**page 45**)

* *N. (Eunebria) psammodes* (Rossi, 1792)

* *N. (E.) picicornis* (F., 1801)

* *N. (N.) brevicollis* (F., 1792)

* *N. (N.) salina* Fairmaire & Laboulbène, 1854

[*N. (N.) rubripes* Serville, 1821)]

* *N. (N.) lafresnayeae* Serville, 1821 subsp. *foudrasi* Dejean, 1828

Notiophilus Duméril, 1806 (**page 47**)

[*N. aquaticus* (L., 1758)]

* *N. pusillus* Waterhouse, 1833

* *N. hypocrita* Curtis, 1829

* *N. rufipes* Curtis, 1829

* *N. biguttatus* (F., 1779)

* *N. quadripunctatus* Dejean, 1826

* *N. substriatus* Waterhouse, 1833

Elaphrus F., 1775 (**page 48**)

* *E. (Elaphropterus) aureus* Ph. Müller, 1821

* *E. (Elaphrus) uliginosus* F., 1775

* *E. (E.) cupreus* Duftschmid, 1813

* *E. riparius* L., 1758

Omophron Latreille, 1802

* *O. limbatum* (F., 1776)

Lorocera Latreille, 1802

* *L. pilicornis* (F., 1775)

Clivina Latreille, 1802 (page 50)

- * *C. fossor* (L., 1758)
- * *C. contracta* (Fourcroy, 1785)

Dyschirius Bonelli, 1810 (page 51)

- * *D. (Dyschiridius) angustatus* Ahrens, 1830
- * *D. (Dyschirius) globosus* (Herbst, 1783)
- * *D. (D.) lafertei* Putzeys, 1846
- * *D. (Dyschiriodes) attenuatus* Putzeys, 1866
- * *D. (D.) aeneus* (Dejean, 1825)
- * *D. (D.) nitidus* (Dejean, 1825)

Perileptus Schaum, 1860

- * *P. areolatus* (Creutzer, 1799)

Thalassophilus Wollaston, 1854 (page 51)

- * *T. longicornis* (Sturm, 1825)

Trechus Clairville, 1806 (page 52)

- * *T. (T.) quadristriatus* (Schrank, 1781)
- * *T. (T.) obtusus* Erichson, 1837

Speotrechus Jeannel, 1922

- * *S. mayeti* (Abeille, 1875)

Duvalius Delarouzée, 1859 (page 56)

- * *D. delphinensis* Abeille, 1869, subsp. *balazuci* Bruneau de Miré, 1948

Trechoblemus Ganglbauer, 1892 (page 53)

- [*T. micros* (Herbst, 1784)]

Lasiotrechus Ganglbauer, 1892

- [*L. discus* (F., 1801)]

Anillus Jacquelin du Val, 1851

- * *A. cebennicus* Balazuc & Bruneau de Miré, 1963

Réserve Biologique Domaniale de Bois Sauvage, Pas Chabrol, altitude 340 mètres, lavage de terre aux pieds des *Quercus pubescens* le 2 mai 1998, HPA leg. & det. La présence à Baravon de cette espèce est presque aussi intéressante que dans le cas de l'*Octavius balazuci*, car cela étend sensiblement vers l'est l'aire de répartition connue de cette remarquable espèce endogée. Précédemment connue de Sampzon, Ruoms, Labeaume, Saint-Alban-sous-Sampzon-Auriolles, Naves, Salavas, Païolive *sensu lato* (rive droite et rive gauche du Chassezac), Barjac, Saint-Jean-de-Maruéjols et Méjeannes-le-Clap. Espèce endémique de la région : les localités extrêmes de l'aire de répartition connue sont éloignées de moins de 30 kilomètres d'est en ouest et du nord au sud !

Eotachys Jeannel, 1941 (page 57)

- * *E. bistriatus* (Duftschmid, 1812)

Porotachys Netolitzky, 1914

- * *P. bisulcatus* (Nicolai, 1822)

Tachyura Motschoulsky, 1862

- * *T. (T.) parvula* (Dejean, 1831)
- * *T. (T.) sexstriata* (Duftschmid, 1812)
- * *T. (T.) inaequalis* (Kolenati, 1845)

Tachyta Kirby, 1837 (page 58)

- * *T. nana* (Gyllenhal, 1810)

Ocys Stephens, 1829

- * *O. harpaloides* (Serville, 1821)
- * *O. quinquestriatus* (Gyllenhal, 1810)

Notaphus Stephens, 1828

- * *N. (Eupetodromus) dentellum* (Thunberg, 1787)
- * *N. (Notaphus) varius* (Olivier, 1795)
- * *N. (N.) semipunctatus* (Donovan, 1806)

Emphanes Motschoulsky, 1850

- * *E. (E.) latiplaga* (Chaudoir, 1850)
- * *E. (E.) azurescens* (Dalla Torre, 1877)

Trepanes Motschoulsky, 1864 (**page 59**)

- * *T. (Diplocampa) assimilis* (Gyllenhal, 1810)
- * *T. (Trepanes) articulatus* (Panzer, 1796)
- * *T. (T.) octomaculatus* (Goeze, 1777)
- * *T. doris* (Panzer, 1797)

Philochthus Stephens, 1828

- * *P. iricolor* Bedel, 1879
- * *P. lunulatus* (Fourcroy, 1785)

Bembidion Latreille, 1802 (**page 60**)

- * *B. quadrimaculatum* (L., 1761)
- * *B. quadripustulatum* (Serville, 1823)

Ocydromus Clairville, 1806

- * *O. (Nepha) lateralis* (Dejean, 1831)
- * *O. (N.) schmidtii* (Wollaston, 1854), subsp. *jeanneli* (M. Dewailly, 1951)
- * *O. (N.) genei* (Küster, 1847)
- * *O. (Omoperypus) hypocrita* (Dejean, 1831)
- * *O. (Peryphiolus) monticola* (Sturm, 1825)
- * *O. (Peryphus) atrocaeruleus* (Stephens, 1828)
- * *O. (P.) fasciolatus* (Duftschmid, 1812)
- * *O. (P.) caeruleus* (Serville, 1826)
- * *O. (P.) bugnioni* (K. Daniel, 1902)
- * *O. (P.) tibialis* (Duftschmid, 1812)
- * *O. (P.) ripicola* (Duftschmid, 1820)
- * *O. (P.) testaceus* (Duftschmid, 1812)
- * *O. (P.) scapularis* (Dejean, 1831)
- * *O. (P.) ustulatus* (L., 1758)
- * *O. (P.) distinguendus* (Jacquelin Duval, 1852)
- * *O. (P.) femoratus* (Sturm, 1825)
- * *O. (P.) andreae* (F., 1787)
- * *O. (P.) geniculatus* Heer, 1837
- * *O. (Ocydromus) decorus* (Zenker, 1801)
- * *O. (Peryphagnes) dalmatinus* (Dejean, 1831) subsp. *latinus* Netol
- * *O. (P.) dalmatinus* (Dejean, 1831) subsp. *africanus*
- * *O. (P.) nitidulus* (Marsham, 1802)

Princidium Motschoulsky, 1864 (**page 62**)

- * *P. (P.) punctulatum* (Drapiez, 1820)

Synechostictus Motschoulsky, 1864

- * *S. dahli* (Dejean, 1831)
- * *S. cribrum* (Jacquelin Duval, 1851)
- * *S. elongatus* (Dejean, 1831)

Phyla Motschoulsky, 1844

- * *P. obtusum* (Serville, 1821)
- * *P. tethys* Netolitzky, 1926

Metallina Motschoulsky, 1850

- * *M. lampros* (Herbst, 1784)
- * *M. pygmaeum* (F., 1792)
- * *M. properans* (Stephens, 1828)

Odontium Le Conte, 1848 (**page 63**)

- * *O. (O.) striatum* (F., 1792)

Asaphidion Des Gozis, 1886

- * *A. caraboides* (Schränk, 1781)
- * *A. pallipes* (Duftschmid, 1812)
- * *A. curtum* (Heyden, 1870)
- * *A. flavipes* (L., 1761)
- * *A. stierlini* (Heyden, 1880)

Penetretus Motschoulsky, 1864

- * *P. rufipennis* (Dejean, 1828)

Patrobus Stephens, 1827

- [*P. atrorufus* (Ström, 1768)]

Perigona Laporte de Castelnau, 1834 (**page 64**)

- * *P. (Trechicus) nigriceps* (Dejean, 1831)

Atranus Le Conte, 1848

- * *A. collaris* (Ménétrières, 1832)

Astigis Rambur, 1838

- * *A. salzmanni* (Germar, 1824)

Stomis Clairville, 1806

- * *S. pumicatus* (Panzer, 1796)

Lagarus Chaudoir, 1838

- * *L. vernalis* (Panzer, 1796)

Poecilus Bonelli, 1810

- * *P. (P.) cupreus* (L., 1758)
- * *P. (P.) caeruleus* (L., 1758)
- * *P. (Macropoecilus) kugelanni* (Panzer, 1797)
- * *P. (M.) sericeus* Fischer, 1823
- * *P. (M.) lepidus* (Leske, 1785)
- [*P. (M.) striatopunctatus* (Duftschmid, 1812)]

Argutor Stephens, 1828 (**page 65**)

- * *A. (A.) diligens* (Sturm, 1824)
- * *A. (A.) strenuus* (Panzer, 1787)
- [*A. (Bothriopterus) angustatus* (Duftschmid, 1812)]

Abax Bonelli, 1810

- * *A. ater* (Villers, 1789)

Platysma Bonelli, 1810

- * *P. (Omaseidius) vulgare* (L., 1758)
- * *P. (P.) nigrum* (Schaller, 1783)
- * *P. (Melanius) anthracinum* (Illiger, 1798)
- * *P. (M.) nigrata* (F., 1792)
- * *P. (M.) gracile* Dejean, 1828
- * *P. (M.) minus* Gyllenhal., 1827

Haptoderus Chaudoir, 1838 (**page 66**)

- * *H. (H.) pumilio* (Dejean, 1828) subsp. *spadiceus* Dejean
- * *H. (H.) amaroides* (Dejean, 1828)

Steropus Dejean, 1821

- * *S. (Steropidius) madidus* (F., 1775)
- * *S. (S.) validus* Dejean, 1828
- * *S. (Feronidius) melas* (Creutzer, 1799)

Pterostichus Bonelli, 1810. (**page 67**)

- * *P. (P.) cristatus* L. Dufschmidt, 1820 subsp. *femoratus* Dejean, 1828
- * *P. (P.) rufipes* Dejean, 1828

Platyderus Stephens, 1828 (**page 69**)

- * *P. ruficollis* (Marsham, 1802)

Synuchus Gyllenhal, 1810

- * *N. nivalis* (Panzer, 1797)

Calathus Bonelli, 1810

- * *C. (C.) mollis* (Marsham, 1802)
- * *C. (C.) melanocephalus* (L., 1758)
- * *C. (C.) micropterus* (Duftschmid, 1812)
- * *C. (C.) piceus* Marsham, 1802
- * *C. (C.) ambiguus* (Paykull, 1790)
- * *C. (C.) erratus* C.R. Sahlberg, 1827
- * *C. (C.) luctuosus* (Latreille, 1804)
- * *C. (C.) fuscipes* (Goeze, 1777)

Dolichus Bonelli, 1810 (**page 70**)

- [*D. halensis* (Schaller, 1783)]

Sphodrus Clairville, 1806

- * *S. leucophthalmus* (L., 1758)

Ceuthosphodrus

- * *C. (Actenipus) oblongus* (Dejean)

Ceuthosphodrus Jeannel, 1914

- * *C. (Actenipus) oblongus* (Dejean, 1828) subsp. *balmae* Delarouzée, 1860

Ceuthosphodrus Jeannel, 1914

- * *C. (Actenipus) oblongus* (Dejean, 1828) subsp. *balmae* Delarouzée, 1860.

Naves : grotte de la Fontaine de Champclos, un mâle courant au fond du puits artificiel d'entrée le 26 novembre 1994 (H.P.A. leg., P.B.D.M. det.). C'est une très intéressante découverte, qui étend sensiblement vers le nord-est la répartition connue de cette belle espèce. Balazuc (1984) trouvait surprenant que ce carabique n'ait jamais été trouvé en Ardèche :

d'intensives recherches biospéologiques menées depuis des décennies n'avaient pas permis de le bioter. De plus, la Fontaine de Champclos est une cavité "classique" souvent prospectée : cette unique capture suggère que la population est numériquement très faible... ou que nous ignorons où exactement et comment elle vit ! L'exemplaire ardéchois a les élytres plus aplatis que ceux de l'Hérault et du Gard que nous avons examinés. En outre, son pronotum et ses élytres sont moins étroits, les épaules sont plus larges, moins effacées. Malgré ces différences qui isolent nettement la forme ardéchoise, comme d'une part il est hasardeux de tirer des conclusions d'un unique individu et comme d'autre part nous nous refusons d'encombrer davantage une nomenclature déjà pléthorique, il ne nous semble pas judicieux de la baptiser. Seule une étude ADN justifierait l'établissement d'un taxon nouveau, de niveau subspécifique voire spécifique.

Pristonychus Dejean, 1828

* *P. terricola* (Herbst, 1783)

Odontonyx Stephens, 1827 (**page 71**)

[*O. rotundatus* (Paykull, 1798)]

* *O. glabricollis* (Germar, 1817)

* *O. fuscatus* (Dejean, 1828)

Anchus Le Conte, 1854

* *A. ruficornis* (Goeze, 1777)

* *A. obscurus* (Herbst, 1784)

Agonum Bonelli, 1810

* *A. (Platynus) assimile* (Paykull, 1790)

* *A. (A.) viridicupreum* (Goeze, 1777)

* *A. (A.) sexpunctatum* (L., 1758)

* *A. (A.) marginatum* (L., 1758)

* *A. (A.) mulleri* (Herbst, 1784)

* *A. (A.) lugens* (Duftschmid, 1812)

* *A. (A.) viduum* (Panzer, 1797)

* *A. (A.) moestum* (Duftschmid, 1812)

* *A. (A.) nigrum* Dejean, 1828

Europhilus Chaudoir, 1859 (**page 72**)

* *E. thoreyi* (Dejean, 1828)

* *E. gracilis* Gyllenhal, 1827)

* *E. micans* (Nicolai, 1822)

Anchomenus Bonelli, 1810

* *A. dorsalis* (Pontoppidan, 1763)

Amara Bonelli, 1810

* *A. (Zezea) plebeja* (Gyllenhal, 1810)

* *A. (Z.) kulti* Fassati, 1947

* *A. (Z.) strenua* Zimmermann, 1831

* *A. (Z.) rufipes* Dejean, 1828

* *A. (Z.) fulvipes* Serville, 1821

* *A. (Amara) montivaga* Sturm, 1825

* *A. (A.) nitida* Sturm, 1825

* *A. (A.) anthobia* Villa, 1833

* *A. (A.) eurynota* (Panzer, 1797)

* *A. (A.) similata* (Gyllenhal, 1810)

* *A. (A.) ovata* (F., 1792)

* *A. (A.) familiaris* (Duftschmid, 1812)

* *A. (A.) lucida* (Duftschmid, 1812)

[*A. (A.) communis* (Panzer, 1797)]

* *A. (A.) convexior* Stephens, 1828

- * *A. (A.) lunicollis* Schiödte, 1837
- [*A. (A.) natvigi* Csiki, 1929]
- * *A. (A.) tibialis* (Paykull, 1798)
- * *A. (A.) aenea* (DeGeer, 1774)
- [*A. (A.) manevali* Jeannel, 1942]

Percosia Zimmermann, 1831 (**page 73**)
[*P. (Celia) municipalis* (Duftschmid, 1812)]
[*P. (C.) bifrons* (Gyllenhal, 1810)]
* *P. (Percosia) equestris* (Duftschmid, 1812)

Bradytus Stephens, 1828 (**page 74**)
* *B. (B.) consularis* (Duftschmid, 1812)
* *B. (B.) fulvus* (DeGeer, 1774)
* *B. (B.) apricarius* (Paykull, 1790)

Cyrtonotus Stephens, 1828
* *C. (C.) aulicus* (Panzer, 1797)

Zabrus Clairville, 1806
* *Z. (Z.) tenebrioides* (Goeze, 1777)

Carterus Dejean, 1829
* *C. (Sabienus) calydonius* (Rossi, 1790)

Ditomus Bonelli, 1810
* *D. capito* (Serville, 1821)
* *D. clypeatus* (Rossi, 1790)

Anisodactylus Dejean, 1829 (**page 75**)
* *A. (A.) binotatus* (F., 1787)
* *A. (A.) nemorivagus* (Duftschmid, 1812)
* *A. (A.) signatus* (Panzer, 1797)

Scybalicus Schaum, 1862
* *S. oblongiusculus* (Dejean, 1829)

Gynandromorphus Dejean, 1829
* *G. etruscus* (Quensel, 1806)

Diachromus Erichson, 1837
* *D. germanus* (L., 1758)

Acinopus Latreille, 1829
* *A. (A.) picipes* (Olivier, 1795)

Parophonus Ganglbauer, 1892
* *P. (P.) maculicornis* (Duftschmid, 1812)
* *P. (P.) mendax* (Rossi, 1790)
* *P. (Ophonomimus) hirsutulus* (Dejean, 1829)

Trichotichnus Morawitz, 1863
* *T. laevicollis* (Duftschmid, 1812)

Ophonus Stephens, 1828 (**page 76**)
* *O. (O.) sabulicola* (Panzer, 1796)

- [*O. (O.) opacus* (Dejean, 1829)]
 * *O. (O.) rotundicollis* Fairmaire & Laboulbène, 1854
 * *O. (O.) wautieri* David & Marchal, 1964
 * *O. (O.) cribricollis* (Dejean, 1829)
 * *O. (O.) similis* (Dejean, 1829)
 * *O. (O.) azureus* (F., 1775) subsp. *gallicus* Pater
 * *O. (O.) subquadratus* (Dejean, 1829)
 * *O. (Metophonus) rupicola* (Sturm, 1818)
 * *O. (M.) brevicollis* (Serville, 1821)
 * *O. (M.) schaubergerianus* Puel, 1937
 * *O. (M.) subpunctatus* Stephens, 1828
 * *O. (M.) cordatus* (Duftschmid, 1812)
 * *O. (M.) puncticeps* Stephens, 1828
 * *O. (M.) puncticollis* (Paykull, 1798)
 * *O. (M.) parallelus* (Dejean, 1829)
 * *O. (Pseudophonus) rufipes* (DeGeer, 1774)
 * *O. (P.) griseus* (Panzer, 1797)
 * *O. (Pardileus) calceatus* (Duftschmid, 1812)

Semiophonus Schaubberger, 1933 (**page 77**)

[*S. signaticornis* (Duftschmid, 1812)]

Harpalus Latreille, 1802

- * *H. (H.) affinis* (Schränk, 1781)
 * *H. (H.) distinguendus* Duftschmid, 1812
 * *H. (H.) oblitus* Dejean, 1829 subsp. *patruelis* Dejean
 * *H. (H.) smaragdinus* Duftschmid, 1812
 [*H. (H.) cupreus* Dejean, 1829]
 * *H. (H.) tenebrosus* Dejean, 1829
 [*H. (H.) melancholicus* Dejean, 1829]
 * *H. (H.) pygmaeus* Dejean, 1829
 * *H. (H.) dimidiatus* (Rossi, 1790)
 * *H. (H.) rubripes* Duftschmid, 1812
 * *H. (H.) quadripunctatus* Dejean, 1829
 * *H. (H.) atratus* Latreille, 1804
 * *H. (H.) latus* (L., 1758)
 * *H. (H.) neglectus* Serville, 1821
 * *H. (H.) fuscipalpis* Sturm, 1818
 * *H. (H.) attenuatus* Stephens, 1828
 * *H. (H.) sulphuripes* Germar, 1824
 * *H. (H.) honestus* Duftschmid, 1812
 * *H. (H.) rufitarsis* Duftschmid, 1812
 * *H. (H.) decipiens* Dejean, 1828
 * *H. (H.) autumnalis* Duftschmid, 1812
 * *H. (H.) serripes* Quensel, 1806
 * *H. (H.) tardus* (Panzer, 1797)
 * *H. (H.) modestus* Dejean, 1829
 * *H. (H.) anxius* Duftschmid, 1812
 * *H. (Actephilus) picipennis* Duftschmid, 1812

Stenolophus Stephens, 1827 (**page 79**)

- * *S. skrimshirani* Stephens, 1828
 * *S. teutonus* (Schränk, 1781)
 * *S. discophorus* (Fisher, 1823)
 * *S. mixtus* (Herbst, 1784)

Egadroma Motschoulsky, 1855

* *E. marginatum* (Dejean, 1829)

Bradycellus Erichson, 1837 (**page 80**)

* *B. (B.) verbasci* (Duftschmid, 1812)

* *B. (B.) harpalinus* (Serville, 1831)

* *B. (B.) collaris* (Paykull, 1798)

Acupalpus Latreille, 1829

* *A. (A.) meridianus* (L., 1767)

* *A. (A.) maculatus* Schaum, 1860

* *A. (A.) luteatus* (Duftschmid, 1812)

* *A. (A.) dubius* Schilsky, 1888

Anthracus Motschoulsky, 1850

* *A. consputus* (Duftschmid, 1812)

Amblystomus Erichson, 1837

* *A. niger* Heer, 1838

Chlaeniellus Reitter, 1908

* *C. vestitus* (Paykull, 1790)

* *C. olivieri* (Crotch, 1870)

* *C. nitidulus* (Schrank, 1781)

* *C. nigricornis* (F., 1787)

* *C. tristis* (Schaller, 1783)

Chlaenites Motschoulsky, 1860 (**page 81**)

* *C. spoliatus* (Rossi, 1790)

Chlaenius Bonelli, 1810

* *C. velutinus* Duftschmid, 1812

[*C. festivus* (Panzer, 1796)]

Dinodes Bonelli, 1810

* *D. decipiens* (Léon Dufour, 1820)

Callistus Bonelli, 1810

* *C. lunatus* (F., 1775)

Panagaeus Latreille, 1804

* *P. crux*major* (L., 1758)

* *P. bipustulatus* (F., 1775)

Neorescius Bedel, 1906 (**page 82**)

* *N. hoffmannseggii* (Panzer, 1797)

Licinus Latreille, 1802

* *L. punctatulus* (F., 1792)

* *L. depressus* (Paykull, 1790)

Badister Clairville, 1806

* *B. (B.) bipustulatus* (F., 1792)

[*B. (Trimorphus) sodatis* (Duftschmid, 1812)]

Baudia Ragusa, 1884

* *B. anomala* (Perris, 1866)

- * *B. dilatata* (Chaudoir, 1837)

Masoreus Dejean, 1828

- * *M. wetterhalli* (Gyllenhal, 1813)

Lamprias Bonelli, 1810 (**page 83**)

- * *L. pubipennis* (Léon Dufour, 1820)
- * *L. cyanocephalus* (L., 1758)
- * *L. chlorocephalus* (Hoffmann, 1803)
- * *L. rufipes* (Dejean, 1825)

Lebia Latreille, 1802

- * *L. crux*minor* (L., 1758)
- * *L. trimaculata* (Villers, 1789)
- * *L. scapularis* (Fourcroy, 1785)
- * *L. marginata* (Fourcroy, 1785)

Demetrias Bonelli, 1810

- * *D. (Aetophorus) imperialis* Germar, 1824
- * *D. (Demetrias) monostigma* Samouelle, 1819
- * *D. (D.) atricapillus* (L., 1758)

Cymindis Latreille, 1806 (**page 84**)

- * *C. (Tarulus) vaporariorum* (L., 1758)
- * *C. (Cymindis) humeralis* (Fourcroy, 1785)
- * *C. (C.) axillaris* (F., 1794)
- * *C. (C.) coadunata* Dejean, 1825

Dromius Bonelli, 1810

- * *D. (Paradromius) linearis* (Olivier, 1795)
- * *D. (Dromius) agilis* (F., 1787)
- * *D. (D.) angustus* Brullé, 1834
- * *D. (D.) meridionalis* Dejean, 1825
- * *D. (D.) fenestratus* (F., 1794)
- * *D. (D.) quadrimaculatus* (L., 1758)

Philorhizus Hope, 1838 (**page 85**)

- * *P. (Calodromius) quadrinotatus* (Panzer, 1801)
- [*P. (C.) bifasciatus* (Dejean, 1825)]
- * *P. (C.) quadrisignatus* (Dejean, 1825)
- * *P. (Philorhizus) melanocephalus* (Dejean, 1825)
- * *P. (P.) notatus* (Stephens, 1828)

Syntomus Hope, 1838

- * *S. obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812)
- * *S. truncatellus* (L., 1761)
- * *S. foveatus* (Fourcroy, 1785)

Lionychus Wissmann, 1846

- * *L. quadrillum* (Duftschmid, 1812)
- * *L. albonotatus* (Dejean, 1825)

Apristus Chaudoir, 1846 (**page 86**)

- * *A. europaeus* Mateu, 1980

Microlestes Schmidt*Goebel, 1846

- [*M. fulvibasis* Reitter, 1900]
- * *M. abeillei* Charles Brisout, 1885
- * *M. negrita* Wollaston, 1854
- * *M. maurus* (Sturm, 1825)
- * *M. minutulus* (Goeze, 1777)
- * *M. gallicus* Holdhaus, 1912
- * *M. seladon* Holdhaus, 1912

Polystichus Bonelli, 1810
 * *P. fasciolatus* (Rossi, 1790)

Drypta Latreille, 1796
 * *D. dentata* (Rossi, 1790)

Brachinus Weber, 1801
 * *B. (B.) crepitans* (L., 1758)
 * *B. (B.) ganglbaueri* Apfelbeck, 1904
 * *B. (Brachinolomus) immaculicornis* Dejean, 1825
 * *B. (Brachinidius) sclopeta* (F., 1792)
 * *B. (Brachinidius) fulviventris* Motschoulsky, 1864
 * *B. (Brachinidius) explodens* Duftschmid, 1812
 * *B. (Brachinidius) glabratus* Latreille & Dejean, 1824

Aptinus Bonelli, 1810 (**page 87**)
 * *A. (A.) pyrenaeus* Dejean, 1825

HALIPLOIDEA

Haliplidae

Peltodytes Régimbart, 1878
 * *P. caesus* (Duftschmid, 1805)
 * *P. rotundatus* (Aubé, 1836)

Haliplus Latreille, 1802 (**page 88**)
 * *H. (Neohaliplus) lineatocollis* Marsham, 1802
 * *H. (Haliplus) immaculatus* Gerhardt, 1877
 * *H. (Liaphlus) mucronatus* Stephens, 1828
 * *H. (L.) fulvus* (F., 1801)

HYGROBIOIDEA

Hygrobiiidae

Hygrobia Latreille, 1804
 * *H. tarda* (Herbst, 1779)

DYTISCOIDEA

Dytiscidae

Hyphydrus Illiger, 1807
 * *H. aubei* Ganglbauer, 1892
 * *H. ovatus* (L., 1761)

Yola Des Gozis, 1886

* *Y. bicarinata* (Latreille, 1804)

Bidessus Sharp, 1880*82

* *B. minutissimus* (Germar, 1824)

* *B. saucius* (Desbrochers, 1871)

Hydroglyphus Motschoulsky, 1853

* *H. pusillus* (F., 1781)

Hygrotus Stephens, 1828 (**page 89**)

* *H. inaequalis* (F., 1777)

Hydroporus Clairville, 1806

* *H. palustris* (L., 1761)

* *H. erythrocephalus* (L., 1758)

* *H. nigrita* (F., 1792)

* *H. tessellatus* Drapiez, 1819

* *H. ferrugineus* Stephens, 1828

* *H. memnonius* Nicolai, 1822

* *H. longulus* Mulsant, 1860

* *H. (H.) discretus* Fairmaire, 1859

* *H. (H.) angustatus* Sturm, 1835

* *H. (H.) gyllenhali* (Schiödt, 1841)

* *H. obsoletus* Aubé, 1836

Siettitia Abeille de Perrin, 1905 (**page 90**)

* *S. avenionensis* Guignot, 1925

Graptodytes Seidlitz, 1887

* *G. varius* (Aubé, 1836)

* *G. ignotus* (Mulsant, 1861)

* *G. bilineatus* (Sturm, 1835)

Scarodytes Des Gozis, 1914 (**page 91**)

* *S. halensis* (F., 1787)

Stictonectes Brinck, 1943

* *S. lepidus* (Olivier, 1795)

Deronectes Sharp, 1880*82

* *D. aubei* (Mulsant, 1843)

* *D. moestus* (Fairmaire, 1858)

* *D. fairmairei* (Leprieur, 1876)

Stictotarsus Zimmermann, 1919

* *S. duodecimpustulatus* (F., 1792)

Nebrioporus Regimbart, 1906 (= *Potamonectes*)

* *N. canaliculatus* (Lacordaire, 1835)

* *N. depressus* (F., 1775) = *elegans*

Oreodytes Seidlitz, 1887. (**page 92**)

* *O. sanmarkii* (Sahlberg, 1826)

* *O. septentrionalis* (Gyllenhal, 1827)

Noterus Clairville, 1806

- * *N. clavicornis* (DeGeer, 1774)

Laccophilus Leach, 1817.

- * *L. hyalinus* (DeGeer, 1774)
- * *L. minutus* (L., 1758)

Platambus Thomson, 1860

- * *P. maculatus* (L., 1758)

Agabus Leach, 1817

- * *A. (Dichonectes) biguttatus* (Olivier, 1795)
- * *A. (D.) nitidus* (F., 1801)
- * *A. (D.) guttatus* (Paykull, 1798)
- * *A. (Gaurodytes) bipustulatus* (L., 1767)
- * *A. (G.) paludosus* (F., 1801)
- * *A. (G.) nebulosus* (Förster, 1771)
- * *A. (G.) chalconotus* (Panzer, 1796)
- * *A. (G.) melanocornis* (Zimmermann, 1915)
- * *A. (G.) sturmi* Gyllenhal, 1808
- * *A. (Agabinectes) brunneus* (F., 1798)
- * *A. (Agabinectes) didymus* (Olivier, 1795)
- * *A. conspersus* (Marsham, 1832)

Ilybius Erichson, 1832 (**page 93**)

- * *I. fuliginosus* (F., 1792)

Rhantus Stephens, 1835

- * *R. (R.) suturalis* (Mac Leay, 1825)
- * *R. (R.) suturellus* Harris, 1848

Colymbetes Clairville, 1806

- * *C. fuscus* (L., 1758)

Meladema Laporte de Castelnau, 1834

- * *M. coriaceum* Laporte de Castelnau, 1834

Graphoderus Stephens, 1835

- * *G. cinereus* (L., 1758)

Acilius Leach, 1817 (**page 94**)

- * *A. (A.) sulcatus* (L., 1758)

Dytiscus L., 1758

- * *D. (Macrodytes) semisulcatus* Müller, 1776
- * *D. (M.) marginalis* L., 1758
- * *D. (M.) pisanus* Laporte de Castelnau, 1834

GYRINOIDEA

Gyrinidae

Gyrinus L., 1758

- * *G. (Gyrinulus) minutus* F., 1798
- * *G. (Gyrinus) colymbus* Erichson, 1847
- * *G. (G.) distinctus* Aubé, 1836
- * *G. (G.) substriatus* Stephens, 1828

- * *G. (G.) caspius* Ménétrés, 1832
- * *G. (G.) urinator* Illiger, 1807
- * *G. (G.) dejeani* Brullé, 1832

Orectochilus Lacordaire, 1835 (**page 95**)

- * *O. (O.) villosus* (Müller, 1776)

MYXOPHAGA

Hydroscaphidae

Hydroscapha Le Conte, 1874 (**page 109**)

- * *H. granulum* (Motschoulsky, 1855)

POLYPHAGA

STAPHYLINOIDEA

Catopidae

Bathysciola Jeannel, 1910 (**page 96**)

- * *B. asperula* (Fairmaire, 1857), subsp. *simoni* (Abeille, 1875)
- * *B. linderi* (Abeille, 1875)

Diaprysius Abeille, 1878 (**page 98**)

- * *D. serullazi* Peyerimhoff, 1904
 - subsp. *serullazi* s. str.
 - subsp. *peyerimhoffi* Jeannel, 1910
 - subsp. *piraudi* Jeannel, 1910
 - subsp. *magdelainei* Jeannel, 1910
 - subsp. *mulleri* Jeannel, 1910
 - subsp. *argodi* Jeannel, 1914
 - subsp. *alberti* Jeannel, 1924
 - subsp. *jolyi* Jeannel, 1936
- * *D. caudatus* Abeille, 1875
 - subsp. *caudatus* s. str.
 - subsp. *caudatissimus* (Abeille, 1876)
- * *D. fagei* Jeannel, 1914
- * *D. gezei* Jeannel, 1936

Choleva Latreille, 1796 (**page 104**)

- * *C. oblonga* Latreille, 1807
- [*C. cisteloides* (Frölich, 1799)]
- * *C. fagniezi* Jeannel, 1922

Ptomaphagus Illiger, 1798

- * *P. subvillosus* (Goeze, 1777)
- * *P. sericatus* Chaudoir, 1845

Nargus Thomson, 1867 (**page 104**)

- * *N. velox* (Spence, 1815)
- * *N. wilkini* (Spence, 1815)

Sciodrepoides Hatch, 1933 (**page 105**)

- * *S. watsoni* (Spence, 1815)

Catops Paykull, 1798

- * *C. subfuscus* Kellner, 1846
- * *C. longulus* Kellner, 1846
- * *C. coracinus* Kellner, 1846
- * *C. kirbyi* Spence, 1815
- * *C. tristis* (Panzer, 1794)
- * *C. neglectus* Kraatz, 1852
- * *C. nigrita* Erichson, 1837
- * *C. fuscus* (Panzer, 1794)
- * *C. fuliginosus* Erichson, 1837
- † *C. bonadonai* Coiffait, 1954 (entrée de la grotte de Celles, un cadavre détérioré en décembre 1946)
- * *C. nigricans* Spence, 1815
- * *C. picipes* (F., 1792)

Catopidius Jeannel, 1922 (page **107**)
 * *C. depressus* (Murray, 1856)

Attaephilus Motschoulsky, 1869
 * *A. arenarius* (Hampe, 1852)

Liodidae

Liodes Latreille, 1796
 * *L. (L.) cinnamomea* (Panzer, 1793)
 * *L. (L.) dubia* (Kugelann, 1794)

Anisotoma Panzer, 1797
 * *A. humeralis* (F., 1792)
 [*A. axillaris* Gyllenhal, 1810]
 * *A. castanea* (Herbst, 1792)

Agathidium Illiger, 1798
 * *A. (Cyphocele) badium* (Erichson, 1792)
 * *A. (C.) atrum* (Paykull, 1798)

Leptinidae

Leptinus Müller, 1817 (page **108**)
 * *L. testaceus* Müller, 1817
Platypsyllus Ritsema, 1869
 * *P. castoris* Ritsema, 1869

Clambidae

Loricaster Mulsant & Rey, 1861 (page **109**)
 * *L. testaceus* Mulsant & Rey, 1861

Ptiliidae (= Atrichopterygidae)

Ptenidium Erichson, 1845
 * *P. (P.) pusillum* (Gyllenhal, 1808)

Acrotrichis Motschoulsky, 1851
 * *A. (A.) atomaria* (DeGeer, 1774)
 * *A. (A.) intermedia* (Gillmeister, 1845)
 * *A. (A.) fascicularis* (Herbst, 1793)

Staphylinidae

Micropeplus Latreille, 1809
 * *M. staphylinoides* (Marscham, 1802)

Phloeocharis Mannerheim, 1830
 * *P. subtilissima* Mannerheim, 1830

Proteinus Latreille, 1796 (**page 110**)
 * *P. ovalis* (Stephens, 1832)
 * *P. brachypterus* (F., 1798)
 * *P. macropterus* (Gyllenhal, 1828)

Metopsia Wollaston, 1854
 * *M. gallica* C. Koch, 1938

Anthobium Stephens, 1832
 [A. (A.) *montivagum* (Heer, 1842)]
 * *A. (A.) torquatum* (Marsham, 1802)
 * *A. rectangulum* Fauvel, 1898

Acrulia Thomson, 1861
 * *A. inflata* (Gyllenhal, 1808)

Phyllodrepa Thomson, 1860
 * *P. floralis* (Paykull, 1789)

Omalium Gravenhorst, 1802 (**page 110**)
 * *O. (O.) rivulare* (Paykull, 1789)
 * *O. (O.) allardi* (Fairmaire, 1859)
 * *O. (O.) rugatum* Rey, 1880
 * *O. (O.) exiguum* Gyllenhal, 1810
 * *O. (O.) excavatum* Stephens, 1832
 * *O. (O.) nigriceps* Kiesenwetter, 1850

Phloeonomus Heer, 1838
 * *P. minimus* (Erichson, 1837)

Xylodromus Heer, 1838*1842
 * *X. concinnus* (Marsham, 1802)

Philorhinum Kraatz, 1858 (**page 111**)
 * *P. sordidum* (Stephens, 1832)

Olophrum Erichson, 1837
 * *O. piceum* (Gyllenhal, 1810)
 [O. *assimile* (Paykull, 1800)]

Acidota Mannerheim, 1830
 * *A. crenata* (F., 1792)

Lesteva Latreille, 1796
 * *L. pubescens* Mannerheim, 1830
 * *L. fontinalis* Kiesenwetter, 1850
 * *L. hanseni* Lohse, 1953
 * *L. longelytrata* (Goeze, 1777)
 * *L. monticola* Kiesenwetter, 1847
 * *L. punctata* Erichson, 1839

Geodromicus Redtenbacher, 1874

- * *G. nigrata* Müller, 1888

Anthophagus Gravenhorst, 1802

- * *A. (Phaganthus) praeustus* Müller, 1821
- * *A. (P.) abbreviatus* (F., 1779)
- * *A. bicornis* Block, 1799

Hadrognathus Schaum, 1852 (**page 112**)

- * *H. longipalpis* (Mulsant & Rey, 1851)

Coryphium Stephens, 1832

- * *C. angusticollis* Stephens, 1832

Boreaphilus Sahlberg, 1834

- * *B. velox* Heer, 1842

Deleaster Sahlberg, 1834

- * *D. dichrous* (Gravenhorst, 1802)

Ancyrophorus Kraatz, 1858

- * *A. (A.) longipennis* (Fairmaire, 1856)
- * *A. (A.) omalinus* (Erichson, 1840)
- * *A. (A.) aureus* Fauvel, 1869
- * *A. (A.) angustatus* (Erichson, 1840)
- * *A. (Misancyrus) flexuosus* Fairmaire & Laboulbène, 1854

Trogophloeus Mannerheim, 1830

- * *T. (Thinodromus) dilatatus* Erichson, 1839
- * *T. (Carpalimus) brebissoni* Fauvel, 1864
- * *T. (Trogophlaeus) bilineatus* Stephens, 1832
- * *T. (T.) rivularis* Motschoulsky, 1860
- * *T. (T.) nitidus* Baudi, 1848
- * *T. (Boopinus) obesus* Kiesenwetter, 1844
- * *T. (B.) politus* Kiesenwetter, 1850
- * *T. (Taenosoma) corticinus* (Gravenhorst, 1806)
- * *T. (T.) subtilis* (Erichson, 1839)
- * *T. (T.) elongatulus* Erichson, 1839
- * *T. (Troginus) exiguus* Erichson, 1839

Styloxys Des Gozis, 1886 (**page 113**)

- * *S. rugosus* (F., 1775)

Oxytelus Gravenhorst, 1802

- * *O. (Caccoporus) piceus* (L., 1767)
- * *O. (Epomotylus) sculptus* Gravenhorst, 1806

Anotylus Thomson, 1859

- * *A. inustus* (Gravenhorst, 1806)
- * *A. sculpturatus* (Gravenhorst, 1806)
- * *A. nitidulus* (Gravenhorst, 1802)
- * *A. complanatus* (Erichson, 1839)

Oxytelopsis Fauvel, 1895

- * *O. tetracarinatus* (Block, 1799)

Ptyctocraerus Thomson, 1861

- * *P. morsitans* (Paykull, 1792)

Platystethus Mannerheim, 1830 (**page 114**)

- * *P. cornutus* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. spinosus* Erichson, 1840
- * *P. nitens* (Sahlberg, 1834)

Bledius Mannerheim, 1830

- * *B. (Blediodes) subterraneus* Erichson, 1830
- * *B. (Blediodes) dissimilis* Erichson, 1840
- * *B. (Blediodes) verres* Erichson, 1840
- * *B. (Blediodes) fossor* Erichson, 1842
- * *B. (Blediodes) opacus* (Block, 1799)

Oxyporus F., 1775

- * *O. rufus* (L., 1758)

Stenus Latreille, 1796

- * *S. (S.) comma* Leconte, 1863
- * *S. (S.) biguttatus* (L., 1758)
- * *S. (S.) guttula* (Müller, 1816)
- * *S. (S.) guynemeri* Jacquelin Duval, 1850
- * *S. (S.) junco* F., 1801
- * *S. (S.) ater* Mannherheim, 1830
- * *S. (S.) longitarsis* Thomson, 1857
- * *S. (S.) providus* Erichson, 1839
- * *S. (S.) stigmula* Erichson, 1840
- * *S. (S.) canaliculatus* Gyllenhal, 1827
- * *S. (Nestus) incanus* Erichson, 1839
- * *S. (N.) pusillus* Stephens, 1832
- * *S. (N.) bupthalmus* Gravenhorst, 1802
- [*S. (N.) atratulus* Erichson, 1839]
- * *S. (N.) argus* Gravenhorst, 1806
- * *S. (Hypostenus) tarsalis* Ljungh, 1804
- * *S. (H.) similis* (Herbst, 1784)
- * *S. (H.) fulvicornis* Stephens, 1832
- * *S. (Hemistenus) binotatus* Ljungh, 1804
- * *S. (H.) nitidiusculus* Stephens, 1832
- * *S. (H.) flavipes* Stephens, 1832
- * *S. (H.) impressus* Germar, 1823
- * *S. (Parastenus) subaeneus* Erichson, 1840
- * *S. (P.) aceris* Stephens, 1832
- * *S. (P.) erichsoni* Rye, 1864
- [*S. (Tesus) brunnipes* Stephens, 1832]

Dianous Samouelle, 1819 (**page 116**)

- * *D. caerulea* (Gyllenhal, 1810)

Octavius Fauvel, 1872

- * *O. balazuci* Jarrige, 1963

Remarquable espèce endogée.

1°) Ardèche :

* Ruoms : terrasse devant la grotte de Baume-Grenas, sous une pierre enfoncée, un seul individu mâle, 8 avril 1963 (Holotype) (non retrouvé depuis dans cette station malgré des inhumations prolongées de fagots et des lavages de terre).

* Salavas : bois des Bruyères, lavage de terre près de la cascade de Font-Garnide, mai 1984, 1 ou 2 exemplaires (J. Balazuc *leg.*).

* Lagorce, vallée de l'Ibie, Réserve biologique domaniale de Bois-Sauvage (vallée du ruisseau de Baravon), deux stations (HPA *leg.*, Jean Orousset *det.*) :

a) Ravin de l'Echarassou, 300 m, lavage de terre aux pieds d'un *Quercus ilex*, 4.I.1997, 1 ex. &, HPA *leg.*

b) Fontbelle, 220 m, lavage de terre du talus au bord du chemin, immédiatement en amont du gué où il coupe le ruisseau, aux pieds des *Quercus pubescens* et érables de Montpellier nains, 25. I. 1997, 2 mâles et 2 femelles. Le 12 avril 1998, au lavage de terre au même endroit, nous en avons retrouvé 7 (mâles ?) et 6 (femelles ? - le symbole du sexe a disparu en changeant de version de windows...) && : abondance extraordinaire d'individus en une seule station pour une espèce prédatrice endogée, habituellement toujours rencontrée par individus isolés. HPA *leg.* Ces 18 individus, dans les collections Jean Orousset et HPA, sont plus nombreux que tous les exemplaires précédemment connus :

2°) Gard :

* Un seul mâle à Saint-Jean-de-Maruéjols, lieu-dit Fontcouverte, sous des dalles marneuses, 15. V. 1983 (P. Leclerc *leg.*).

Astenus Stephens, 1832

* *A. (A.) longelytratus* Palm, 1936

* *A. (Astenognathus) unicolor* Mulsant & Rey, 1877

* *A. (Astenognathus) subditus* Mulsant & Rey, 1877

Paederus F., 1775 (**page 117**)

[*P. balcanicus* C. Koch, 1938]

* *P. littoralis* Gravenhorst, 1802

* *P. caligatus* Erichson, 1840

* *P. fuscipes* Curtis, 1840

Paederidus (Mulsant & Rey, 1877)

* *P. rubrothoracicus* (Goeze, 1777)

* *P. ruficollis* (F., 1781)

Stilicus Latreille, 1825

* *S. geniculatus* Erichson, 1839

* *S. rufipes* Germar, 1836

* *S. angustatus* (Fourcroy, 1785)

* *S. festivus* (Mulsant & Rey, 1853)

* *S. orbiculatus* (Paykull, 1789)

Euscopaeus Sharp, 1886

* *E. didymus* (Erichson, 1840)

* *E. minutus* (Erichson, 1840)

Scopaeus Erichson, 1840

* *S. laevigatus* (Gyllenhal, 1827)

* *S. longicollis* Fauvel, 1874

* *S. cognatus* Mulsant & Rey, 1877

* *S. balazuci* Coiffait, 1968

Hyposcopaeus Coiffait, 1960 (**page 118**)

* *H. scitulus* (Baudi, 1857)

Medon Stephens, 1832

- * *M. castaneus* (Gravenhorst, 1802)
- * *M. brunneus* (Erichson, 1839)
- * *M. fuscus* (Mannherheim, 1830)
- * *M. ripicola* Kraatz, 1854
- * *M. piceus* Kraatz, 1858

Luzea Casey, 1905 (**page 119**)

- * *L. nigrifolia* (Erichson, 1840)

Hypomedon Mulsant & Rey, 1877

- * *H. bicolor* (Olivier, 1794)
- * *H. propinquus* (Charles Brisout, 1867)
- * *H. melanocephalus* (F., 1792)
- * *H. aveyronensis* (Mathan, 1862)

Pseudomedon Mulsant & Rey, 1877

- * *P. obsoletus* (Nordmann, 1836)
- * *P. obscurellus* (Erichson, 1840)

Lathrobium Gravenhorst, 1802

- * *L. (L.) crassipes* Mulsant & Rey, 1877
- * *L. (L.) ripicola* Czwalińska, 1888
- * *L. (L.) fulvipenne* Gravenhorst, 1806
- * *L. (Tetartopeus) angustatum* (Lacordaire, 1835)
- * *L. (T.) terminatum* Gravenhorst, 1802

Lobrathium Mulsant & Rey, 1877 (**page 120**)

- * *L. multipunctum* (Gravenhorst, 1802)

Pseudobium Mulsant & Rey, 1877

- * *P. gridellii* Jarrige, 1947

Platydomene Ganglbauer, 1895

- * *P. picipes* (Erichson, 1840)
- * *P. angusticollis* (Boisduval & Lacordaire, 1835)

Scimbalium Erichson, 1840

- * *S. (Micrillus) pubipenne* Fairmaire, 1860

Achenium Curtis, 1826

- * *A. depressum* (Gravenhorst, 1802)

Leptacinus Erichson, 1839

- * *L. pusillus* (Stephens, 1832)
- * *L. sulcifrons* (Stephens, 1832)

Phacophallus Coiffait, 1956

- * *P. parumpunctatus* (Gyllenhal, 1827)

Gauropterus Thomson, 1860

- * *G. fulgidus* (F., 1787)

Gyrohypnus Samouelle, 1819

- * *G. (G.) angustatus* (Stephens, 1832)
- * *G. (G.) fracticornis* (Müller, 1776)

Leptolinus Kraatz, 1856 (**page 121**)

- * *L. (L.) nothus* (Erichson, 1840)

Nudobius Thomson, 1860

- * *N. lentus* (Gravenhorst, 1806)

Xantholinus Dejean, 1821

- * *X. (X.) linearis* (Olivier, 1794)
- * *X. (X.) longiventris* Heer, 1839
- * *X. (X.) gallicus* Coiffait, 1956
- * *X. (Helicophallus) distans* Mulsant & Rey, 1853

Othius Stephens, 1829

- * *O. punctulatus* (Goeze, 1777)
- * *O. angustus* Stephens, 1832
- * *O. lapidicola* Kiesenwetter, 1848
- * *O. myrmecophilus* Kiesenwetter, 1843
- * *O. laeviusculus* Stephens, 1832

Baptolinus Kraatz, 1856

- * *B. pilicornis* (Paykull, 1790)
- * *B. affinis* (Paykull, 1789)

Leptotyphlus Fauvel, 1874

- * *L. audrasi* Jarrige, 1949

Erichsonius Fauvel, 1872

- * *E. (Parerichsonius) signaticornis* (Mulsant & Rey, 1863)

Gabrius Curtis, 1829 (**page 122**)

- * *G. nigrifulus* (Gravenhorst, 1802)
- * *G. nigrifuloides* Coiffait, 1963
- [*G. velox* (Sharp, 1910)]
- [*G. vernalis* (Gravenhorst, 1806)]
- * *G. exiguus* Nordmann, 1837
- * *G. astutus* (Erichson, 1840)
- * *G. pennatus* Sharp, 1910

Paragabrius Coiffait, 1963

- * *P. (P.) fulvipes* (F., 1792)
- * *P. (P.) micans* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) palustris* (Charles Brisout, 1859)

Rabigus Mulsant & Rey, 1875

- * *R. pullus* (Nordmann, 1837)

Philonthus Curtis, 1829

- * *P. (P.) rectangulus* Sharp, 1874
- * *P. (P.) discoideus* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810)
- * *P. (P.) rufimanus* Erichson, 1840
- * *P. (P.) sanguinolentus* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) fimetarius* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) intermedius* Boisduval & Lacordaire, 1835
- * *P. (P.) laminatus* (Creutzer, 1799)
- * *P. (P.) politus* (L., 1758)

- * *P. (P.) succicola* (Thomson, 1860)
- * *P. (P.) rotundicollis* (Ménétries, 1832)
- * *P. (P.) tenuicornis* Mulsant & Rey, 1853
- * *P. (P.) cognatus* (Stephens, 1832)
- * *P. (P.) fuscipennis* (Mannherheim, 1830)
- * *P. (P.) pachycephalus* Nordm., 1837
- * *P. (P.) cephalotes* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) cruentatus* (Gmelin, 1790)
- * *P. (P.) varians* (Paykull, 1789)
- * *P. (P.) pseudovarians* Strand, 1941
- * *P. (P.) jurgans* Tottenham, 1937
- * *P. (P.) caerulea* (Boisduval & Lacordaire, 1835)
- * *P. (P.) carbonarius* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) corruscus* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) concinnus* (Gravenhorst, 1802)
- [*P. (P.) immundus* (Gyllenhal, 1810)]
- * *P. (P.) splendens* (F., 1792)
- * *P. (P.) nigrita* (Gravenhorst, 1806)
- * *P. (Kenonthus) montivagus* Heer, 1839

Spatulonthus Tottenham, 1955 (**page 124**)

- * *S. cochleatus* (Scheerpeltz, 1937)

Neobisnius Ganglbauer, 1895

- * *N. prolixus* (Erichson, 1840)
- * *N. procerulus* (Gravenhorst, 1806)

Dinothenarus Thomson, 1858

- * *D. flavocephalus* (Goeze, 1777)
- * *D. pubescens* (DeGeer, 1774)

Parabemus Reitter, 1909 (**page 125**)

- * *P. fossor* (Scopoli, 1772)

Ontholestes Ganglbauer, 1895

- * *O. tessellatus* (Fourcroy, 1785)
- * *O. murinus* (L., 1758)

Emus Leach, 1819

- * *E. hirtus* (L., 1758)

Platydracus Thomson, 1858

- * *P. fulvipes* (Scopoli, 1763)
- * *P. stercorarius* (Olivier, 1794)
- * *P. flavopunctatus* (Latreille, 1804)

Staphylinus L., 1758

- * *S. caesareus* (Cederhjelm, 1798)
- * *S. dimidiaticornis* Gemminger & Harold, 1851

Ocypus Leach, 1819

- * *O. olens* (Müller, 1764)
- [*O. brunnipes* (F., 1781)]
- * *O. chevrolati* (Baudi, 1848)
- * *O. ophthalmicus* (Scopoli, 1763)
- * *O. similis* (F., 1792)

Pseudocypus Mulsant & Rey, 1875 (**page 126**)

- * *P. (P.) aethiops* (Waltl, 1835)
- * *P. (P.) fuscatus* (Gravenhorst, 1802)
- * *P. (P.) fulvipennis* (Erichson, 1840)
- * *P. (P.) picipennis* (F., 1792)
- * *P. (P.) aeneocephalus* (DeGeer, 1774)
- * *P. cupreus* Rossi, 1849

Tasgius Stephens, 1832

- * *T. (T.) pedator* (Gravenhorst, 1802)

Creophilus Mannerheim, 1830

- * *C. maxillosus* (L., 1758)

Quedius Stephens, 1832

- [*Q. (Microsaurus) longicornis* (Kraatz, 1858)]
- * *Q. (M.) fulgidus* (F., 1787)
- * *Q. (M.) mesomelinus* (Marsham, 1802)
- * *Q. (M.) cruentus* (Olivier, 1794)
- * *Q. (M.) ochripennis* Ménétries, 1835
- * *Q. (M.) brevicornis* Thomson, 1860
- * *Q. (M.) brevis* (Erichson, 1840)
- * *Q. (M.) scitus* (Gravenhorst, 1806)
- * *Q. (M.) xanthopus* (Erichson, 1839)
- * *Q. (M.) lateralis* (Gravenhorst, 1802)
- * *Q. (Distichalius) cinctus* (Paykull, 1790)
- * *Q. (Quedionuchus) plagiatu* Mannherheim, 1843
- * *Q. (Quedius) curtispennis* Bernhauer, 1908
- * *Q. (Q.) tristis* (Gravenhorst, 1802)
- [*Q. (Q.) unicolor* KiesenwetterErichson, 1847]
- [*Q. (Q.) molochinus* (Gravenhorst, 1806)]
- * *Q. (Q.) simplicifrons* Fairmaire, 1861
- * *Q. (Microquedius) auricomus* Kiesenwetter, 1850
- * *Q. (Quediops) scintillans* (Gravenhorst, 1806)
- * *Q. (Sauridus) dubius* (Heer, 1834)
- * *Q. (S.) picipes* (Mannherheim, 1830)
- * *Q. (S.) obliterated* (Erichson, 1840)
- * *Q. (S.) nemoralis* (Baudi, 1848)
- * *Q. (S.) pseudoumbrius* Lohse, 1958
- * *Q. (S.) suturalis* Kiesenwetter, 1845
- * *Q. (S.) fumatus* (Stephens, 1832)
- * *Q. (S.) nigriceps* (Kraatz, 1858)
- * *Q. (S.) praecox* (Gravenhorst, 1802)
- * *Q. (S.) maurorufus* (Gravenhorst, 1806)
- * *Q. (Raphirus) semiaeneus* (Stephens, 1832)
- * *Q. (R.) paradisiensis* (Heer, 1842)
- * *Q. (R.) semiobscurus* (Marsham, 1802)
- * *Q. (R.) boops* (Gravenhorst, 1802)
- * *Q. (R.) schatzmayri* Gridelli, 1922
- * *Q. (R.) aridulus* Jansson, 1939

Velleius Mannerheim, 1830 (**page 129**)

- * *V. dilatatus* (F., 1787)

Astrapaeus Gravenhorst, 1802

* *A. ulmi* (Rossi, 1790)

Euryporus Erichson, 1839

[*E. picipes* (Paykull, 1800)]

Mycetoporus Mannerheim, 1830 (**page 130**)

* *M. piceolus* (Rey, 1882)

* *M. mulsani* Ganglbauer, 1895

* *M. baudueri* (Mulsant & Rey, 1875)

* *M. clavicornis* (Stephens, 1832)

Bryoporus Kraatz, 1858

* *B. crassicornis* (Mäklin, 1847)

Bolitobius Mannerheim, 1830

* *B. (Lordithon) trinotatus* Erichson, 1839

* *B. (L.) thoracicus* (F., 1777)

* *B. (L.) exoletus* Erichson, 1839

* *B. (Bolitobius) lunulatus* (L., 1767)

Bryocharis Boisduval & Lacordaire, 1835

* *B. barnevillei* Pandellé, 1869

* *B. cingulata* (Mannerheim, 1830)

Conosoma Kraatz, 1858

* *C. littoreum* (L., 1758)

* *C. pubescens* (Gravenhorst, 1802)

* *C. lividum* (Erichson, 1840)

* *C. crypticola* (Rey, 1881)

* *C. cavicola* Scriba, 1930

* *C. marshami* (Stephens, 1832)

Tachyporus Gravenhorst, 1806 (**page 131**)

* *T. (T.) nitidulus* (F., 1781)

* *T. (T.) scitulus* Erichson, 1839

* *T. (T.) pusillus* Gravenhorst, 1806

* *T. (T.) solutus* Erichson, 1840

* *T. (T.) hypnorum* (F., 1775)

* *T. (T.) formosus* Matthew, 1858

[*T. (T.) atriceps* Stephens, 1832]

Tachinus Gravenhorst, 1802

* *T. (T.) proximus* Kraatz, 1855

* *T. (T.) fimetarius* Gravenhorst, 1802

* *T. (T.) bonvouloiri* Pandellé, 1869

* *T. (T.) pallipes* Gravenhorst 1806

* *T. (T.) rufipennis* Gyllenhal, 1810

[*T. (T.) collaris* Gravenhorst, 1802]

* *T. (T.) flavipes* (F., 1775)

* *T. (T.) rufipes* (DeGeer, 1774)

* *T. (T.) laticollis* Gravenhorst, 1802

Leucoparyphus Kraatz, 1858 (**page 131**)

* *L. silphoides* (L., 1735)

Hypocyptus Mannerheim, 1830

* *H. seminulum* Erichson, 1839

- * *H. ovulum* Heer, 1838

Habrocerus Erichson, 1839

- * *H. capillaricornis* (Gravenhorst, 1806)

Trichophya Mannerheim, 1830 (**page 132**)

- * *T. pilicornis* (Gyllenhal, 1810)

Gymnusa Gravenhorst, 1806

- * *G. brevicollis* (Paykull, 1800)
- * *G. variegata* Kiesenwetter, 1845

Myllaena Erichson, 1837

- * *M. brevicornis* (Matthew, 1838)
- * *M. infuscata* Kraatz, 1853
- * *M. minuta* (Gravenhorst, 1806)
- * *M. kraatzi* Sharp, 1871
- * *M. elongata* Matthew, 1838
- * *M. tenuicornis* Fauvel, 1900
- * *M. intermedia* Erichson, 1839

Oligota Mannerheim, 1830

- * *O. (O.) pilicornis* Fauvel, 1891
- * *O. (O.) pusillima* (Gravenhorst, 1806)
- * *O. (O.) pumilio* Kiesenwetter, 1858

Gyrophæna Mannerheim, 1830 (**page 133**)

- * *G. (G.) angustata* Stephens, 1832
- * *G. (G.) joyi* Wendeler, 1924
- * *G. (Phænogyra) polita* (Gravenhorst, 1802)
- * *G. (Agaricophæna) boleti* (L., 1758)

Thectura Thomson, 1858

- * *T. cuspidata* (Erichson, 1839)

Leptusa Kraatz, 1857

- * *L. (L.) angusta* (Aubé, 1850)
- * *L. (Pisalia) difformis* (Mulsant & Rey, 1853)
- * *L. fumida* (Erichson, 1840)
- * *L. ruficollis* (Erichson, 1840)

Paraleptusa Peyerimhoff, 1901 (**page 134**)

- * *P. helitasi* (Peyerimhoff, 1900) subsp. *helvia* Sainte Claire Deville, 1927

Bolitochara Mannerheim, 1830

- * *B. (Ditropalia) mulsanti* Sharp, 1875

Autalia Mannerheim, 1830

- * *A. impressa* (Olivier, 1795)
- * *A. rivularis* (Gravenhorst, 1802)

Falagria Mannerheim, 1830 (**page 135**)

- * *F. (Anaulacaspis) thoracica* Curtis, 1833

Cordalia Jacobs, 1924

- * *C. obscura* (Gravenhorst, 1802)

Ilysa Mulsant & Rey, 1875

- * *I. fugax* (Erichson, 1840)

Ischnopoda Thomson, 1861

- * *I. (I.) umbratica* (Erichson, 1839)

Tachyusa Erichson, 1839

- * *T. (T.) coarctata* Erichson, 1839
- * *T. (T.) concinna* Kraatz, 1858
- * *T. (T.) objecta* Mulsant & Rey, 1870
- * *T. (T.) nitella* Fauvel, 1895
- * *T. (Caliusa) balteata* Erichson, 1840

Gnypeta Thomson, 1858

- * *G. ripicola* (Kiesenwetter, 1844)

Amischa Thomson, 1858

- * *A. analis* (Gravenhorst, 1802)
- * *A. decipiens* (Sharp, 1869)

Dadobia Thomson, 1858

- * *D. immersa* (Erichson, 1839)

Callicerus Gravenhorst, 1802 (**page 136**)

- * *C. (C.) obscurus* Gravenhorst, 1802
- * *C. (Semiris) rigidicornis* Erichson, 1840

Geostiba Thomson, 1858

- [*G. (Lioglutosipalia) cebennica* Jarrige, in litt.]

Alaobia Thomson, 1858

- * *A. scapularis* (R.C. Sahlberg, 1834)

Earota Mulsant & Rey, 1873

- * *E. reyi* (Kiesenwetter, 1850)

Atheta Thomson, 1859

- * *A. (A.) euryptera* (Stephens, 1832)
- * *A. (A.) trinotata* (Kraatz, 1858)
- * *A. (A.) wüsthoffi* G. Benick, 1938
- * *A. (Hydrosmecta) thinobioides* (Kraatz, 1854)
- * *A. (H.) delicatula* Sharp, 1869
- * *A. (H.) fragilis* (Kraatz, 1854)
- * *A. (H.) fluviatilis* (Kraatz, 1854)
- * *A. (Dilacra) luteipes* (Erichson, 1839)
- * *A. (Dacrita) fallax* (Kraatz, 1858)
- * *A. (Glossola) gregaria* (Erichson, 1840)
- * *A. (Aloconota) currax* (Kraatz, 1858)
- * *A. (Aloconota) planifrons* Waterhouse, 1863
- * *A. (Aloconota) insecta* (Thomson, 1856)
- * *A. (Aloconota) sulcifrons* (Stephens, 1832)
- * *A. (Aloconota) cambrica* (Wollaston, 1855)
- * *A. (Philhygra) volans* Scriba, 1859
- * *A. (Traumoecia) angusticollis* (Thomson, 1856)
- * *A. (T.) picipes* (Thomson, 1856)
- * *A. (T.) palustris* (Kiesenwetter, 1844)

- * *A. (Bessobia) spatula* Fauvel, 1872
- * *A. (Microdota) amicula* (Stephens, 1832)
- * *A. (M.) spatuloides* G. Benick, 1939
- * *A. (M.) excelsa* Bernhauer, 1911
- * *A. (Ceritaxa) testaceipes* (Heer, 1842)
- * *A. (C.) wasserburgeri* Bernhauer, 1931
- * *A. (C.) septentrioitalica* Scheerpeltz, 1960
- * *A. (Xenota) nigricornis* (Thomson, 1852)
- * *A. (X.) divisa* (Maerk., 1844)
- * *A. (X.) oblita* (Erichson, 1840)
- * *A. (X.) coriaria* (Kraatz, 1858)
- * *A. (X.) sodalis* (Erichson, 1839)
- * *A. (X.) crassicornis* (F., 1792)
- * *A. (X.) britanniae* Bernhauer & Scheerpeltz, 1934
- * *A. (X.) subcavicola* Charles Brisout, 1863
- * *A. (X.) xanthopus* (Erichson, 1839)
- * *A. (X.) trinotata* (Kraatz, 1858)
- * *A. (X.) cadaverina* (Charles Brisout, 1860)
- * *A. (Hypatheta) incognita* Sharp, 1869
- * *A. (H.) pertyi* (Heer, 1842)
- * *A. (H.) aquatica* (Thomson, 1852)
- * *A. (H.) aquatilis* Thomson, 1867
- * *A. (Liogluta) granigera* (Kiesenwetter, 1850)
- * *A. (L.) longiuscula* (Gravenhorst, 1802)
- * *A. (Dimetrota) knabli* G. Benick, 1938
- * *A. (D.) marcida* (Erichson, 1839)
- * *A. (D.) livida* (Mulsant & Rey, 1852)
- * *A. (D.) atramentaria* (Gyllenhal, 1810)
- * *A. (D.) ischnocera* Thomson, 1870
- * *A. (Datomicra) nigra* (Kraatz, 1858)
- * *A. (Chaetida) longicornis* (Gravenhorst, 1802)
- * *A. (Acrotona) sordida* (Marsham, 1802)
- * *A. (A.) aterrima* (Gravenhorst, 1802)
- * *A. (A.) muscorum* Charles Brisout, 1860
- * *A. (A.) parens* (Mulsant & Rey, 1852)
- * *A. (A.) fimorum* Charles Brisout, 1860
- * *A. (A.) fungi* (Gravenhorst, 1806)
- * *A. (A.) obfuscata* (Gravenhorst, 1802)
- * *A. (Meotica) tenuis* Mulsant & Rey, 1875
- * *A. (Acronota) orbata* (Erichson, 1839)
- * *A. deformis* Kraatz, 1856

Astilbus Stephens, 1832 (**page 140**)

- * *A. (A.) canaliculatus* (F., 1787)
- * *A. (A.) meridianus* Fauvel, 1900

Zyras Stephens, 1832

- * *Z. (Z.) fulgidus* (Gravenhorst, 1806)
- * *Z. (Z.) humeralis* (Gravenhorst, 1802)

Lomechusa Gravenhorst, 1806

[*L. strumosa* (F., 1775)]

Phloeopora Erichson, 1839

- * *P. corticalis* (Gravenhorst, 1802)

Ilyobates Kraatz, 1858

- * *I. nigricollis* (Paykull, 1800)

Chilopora Kraatz, 1858

- C. longitarsis* (Erichson, 1839)

Ocalea Erichson, 1839

- * *O. (O.) badia* Erichson, 1839
- * *O. (O.) picata* (Stephens, 1832)
- * *O. (O.) rivularis* Miller, 1851
- * *O. (O.) concolor* Kiesenwetter, 1847

Ocyusa Kraatz, 1858 (**page 141**)

- * *O. nigrata* (Fairmaire & Laboulbène, 1854)

Euryalea Mulsant & Rey, 1874

- * *E. decumana* (Erichson, 1840)

Oxypoda Mannerheim, 1830

- * *O. (O.) vittata* Maerker, 1842
- * *O. (Deroclea) rugatipennis* Kraatz, 1885
- * *O. (Podoxya) sericea* Heer, 1842
- * *O. (P.) umbrata* (Gyllenhal, 1810)
- * *O. (P.) exoleta* (Erichson, 1840)
- * *O. (Mycetodrepa) alternans* (Gravenhorst, 1802)
- * *O. (M.) formosa* Kraatz, 1856
- * *O. (Bessopora) ferruginea* (Erichson, 1840)

Platyola Mulsant & Rey, 1874

- * *P. fusicornis* (Mulsant & Rey, 1852)

Dasyglossa Kraatz, 1858 (**page 142**)

- * *D. prospera* (Erichson, 1840)

Microglotta Kraatz, 1862

- * *M. gentilis* (Maerker, 1844)

Aleochara Gravenhorst, 1802

- * *A. (A.) laticornis* Kraatz, 1858
- * *A. (A.) curtula* (Goeze, 1777)
- * *A. (A.) lata* Gravenhorst 1802
- * *A. (Isochara) tristis* Gravenhorst, 1806
- * *A. (Heterochara) clavicornis* Redtenbacher, 1848
- * *A. (Baryodma) intricata* (Mannerheim, 1830)
- * *A. (Euryodma) brevipennis* Gravenhorst, 1806
- * *A. (Coprochara) bipustulata* (L., 1761)
- [*A. (Polychara) maculata* Charles Brisout, 1863]
- * *A. (P.) crassicornis* Mulsant & Rey, 1874
- * *A. (P.) lanuginosa* Gravenhorst, 1802
- * *A. (P.) diversa* J. Sahlberg, 1876
- * *A. (Homoeochara) sparsa* Heer, 1842
- * *A. (H.) villosa* (Mannerheim, 1830)

Hydraenidae

Hydraena Kugelann, 1794 (**pages 154 & 155**)

- * *H. (Phothydraena) testacea* Curtis, 1830
- * *H. (Hydraena) riparia* Kugelann, 1794
- * *H. (H.) subimpressa* Rey, 1885
- * *H. (H.) cordata* Schaufuss, 1883
- * *H. (H.) angulosa* Mulsant, 1844
- * *H. (H.) rufipes* Curtis, 1830
- * *H. (Haenydra) bicuspidata* Ganglbauer, 1901
- * *H. (Haenydra) gracilis* Germar, 1824
- * *H. (Haenydra) truncata* Rey, 1885
- [*H. (Haenydra) producta* Mulsant & Rey, 1852]
- * *H. (Hadrenya) minutissima* Stephens, 1839
- * *H. nigrita* Germar, 1824

Ochthebius Leach, 1815

- * *O. (Asiobates) bicolon* Germar, 1824
- * *O. (A.) striatus* (Laporte de Castelnau, 1840)
- * *O. (Bothochius) nobilis* (Villa, 1835)
- * *O. dilatatus* Stephens, 1829

Limnebius Leach, 1817

- * *L. (L.) truncatellus* (Thunberg, 1794)
- [*L. (L.) nitidus* (Marsham, 1802)]

Eucinetidae (Staphylinidae Eucinetinae)*Eucinetus* Germar, 1818

- * *E. meridionalis* Laporte de Castelnau, 1836

Silphidae*Nicrophorus* Heer, 1841 (= *Necrophorus*)

- * *N. humator* (Gleditsch, 1767)
- * *N. interruptus* (Stephens, 1830) (= *fossor* Erichson, 1837)
- [*N. investigator* Zetterstedt, 1824]

Mont Mézenc (Haute-Loire) : Croix de Peccata, à la lampe U.V., les 19 août 1994 et 13 juillet 1996 (R.S. *leg.*, R.A. *det.*.)]

- * *N. vespillo* (L., 1758)
- * *N. vespilloides* (Herbst, 1783)
- * *N. vestigator* (Herschel, 1807)

Necrodes Leach, 1815 (**page 144**)

- * *N. (N.) littoralis* (L., 1761)

Thanatophilus Leach, 1815

- * *T. sinuatus* (F., 1775)
- * *T. rugosus* (L., 1758)

Oeceoptoma Leach, 1815

- * *O. thoracicum* (L., 1758)

Blitophaga Reitter, 1884

- * *B. opaca* (L., 1758)
- * *B. undata* (Müller, 1776)

Silpha L., 1758

- * *S. obscura* L. 1758

- * *S. puncticollis* Lacordaire, 1849
- * *S. granulata* Thunberg, 1794
- * *S. tyrolensis* Laicharting, 1781
- * *S. olivieri* Bedel, 1887

Ablattaria Reitter, 1889 (**page 145**)

- * *A. laevigata* (F., 1775)

Phosphuga Leach, 1817

- * *P. atrata* (L., 1758)

Staphylinidae Scaphidiinae

Scaphisoma Leach, 1815

- * *S. (Caryoscapha) limbatum* Erichson, 1845*48
- * *S. (S.) boleti* (Panzer, 1793)
- * *S. (S.) assimile* (Erichson, 1845)

Scaphidium Olivier, 1790

- * *S. quadrimaculatum* Olivier, 1790

Staphylinidae Pselaphinae

Faronus Aubé, 1844

- * *F. lafertei* Aubé, 1844

Euplectus Leach, 1817

- * *E. duponti* Aubé, 1833

Trimium Aubé, 1833

- * *T. brevicorne* (Reichenbach, 1816)

Batrisodes Reitter, 1881 (**page 146**)

- [*B. venustus* (Reichenbach, 1816)]
- [*B. buqueti* (Aubé, 1883)]
- * *B. oculatus* (Aubé, 1833)

Paramaurops Jeannel, 1948 *sensu* Besuchet, 1986

- † *P. abeillei* (Saulcy, 1875) (1 ex., Orgnac, sept. 1945)

Bythinus Leach, 1817

- * *B. macropalpus* Aubé, 1833

Bryaxis Kugelann, 1791

- * *B. pyrenaeus* Saulcy, 1863
- * *B. cebennicus* (Jeannel, 1950)
- * *B. asturiensis* Reitter, 1879
- * *B. puncticollis* (Denny, 1825)
- * *B. latebrosus* Reitter, 1884
- * *B. fauconneti* (Fauvel, 1886)
- * *B. grilati* (Fauvel, 1886)
- * *B. bulbifer* (Reichenbach, 1816)

Tychus Leach, 1817 (**page 147**)

- * *T. striola* Guillebeau, 1888

Rybaxis Saulcy, 1876 (**page 148**)

- * *R. longicornis* (Leach, 1817)
- * *R. laminatus* (Motschoulsky, 1836)

Brachygluta Thomson, 1859

- * *B. fossulata* (Reichenbach, 1816)
- * *B. lefebvrei* (Aubé, 1833)
- * *B. apennina* Saulcy, 1874
- * *B. xanthoptera* (Reichenbach, 1816)
- * *B. perforata* (Aubé, 1833)
- * *B. trigonoprocta* (Ganglbauer, 1895)

Reichenbachia Leach, 1825

- * *R. juncorum* (Leach, 1817)
- * *R. nigriventris* (Schaum, 1859)
- * *R. antennata* Aubé, 1833

Trissemus Jeannel, 1949

- * *T. antennatus* (Aubé, 1833)

Pselaphus Herbst, 1792 (**page 149**)

- * *P. heisei* Herbst, 1792

Ctenistes Reichenbach, 1816

- * *C. palpalis* Reichenbach, 1816

Scydmaenidae

Cephennium Müller & Kunze, 1822

- * *C. (C.) laticolle* Aubé, 1842
- * *C. (C.) thoracicum* Müller & Kunze, 1822
- * *C. (Geodytes) minutissimum* Aubé, 1842
- * *C. (Cephennarium) lavagnei* (Normand, 1916)

Stenichnus Thomson, 1861

- * *S. (Cyrtoscydmus) scutellaris* (Müller & Kunze, 1822)
- * *S. (C.) helferi* (Schaum, 1841)
- * *S. (C.) collaris* (Müller & Kunze, 1822)

Euconnus Thomson, 1821

- * *E. (Microscydmus) intrusus* Schaum, 1844

Histeridae Histerinae

Margarinotus Marseul, 1853

- * *M. (Ptomister) merdarius* (Hoffmann, 1803)
- * *M. (P.) brunneus* (F., 1775) (= *cadaverinus* Hoffmann, 1803)
- * *M. (P.) striola* Sahlberg, 1819 subsp. *succicola* (Thomson, 1862)
- * *M. (Stenister) obscurus* (Kugelann, 1792) (= *stercorarius* Hoffmann, 1803)
- * *M. (Promethister) marginatus* Erichson, 1834
- * *M. (Paralister) purpurascens* (Herbst, 1792)
- [*M. (P.) neglectus* (Germar, 1813)]
- * *M. (P.) ventralis* (Marseul, 1854)
- * *M. (P.) ignobilis* (Marseul, 1854)

Pactolinus Motschoulsky, 1859

- * *P. major* (L., 1767)

Pachylister Lewis, 1904

- * *P. (P.) inaequalis* (Olivier, 1789)

Hister L., 1758

- * *H. quadrimaculatus* L., 1758
- * *H. unicolor* L., 1758
- * *H. teter* Truqui, 1852
- * *H. quadrinotatus* Scriba, 1790
- * *H. illigeri* Duftschmid, 1805 (= *uncinatus* Illiger, 1807)
- * *H. helluo* Truqui, 1852
- * *H. lugubris* Truqui, 1852
- * *H. moerens* Erichson, 1834

Atholus Thomson, 1859

- * *A. bimaculatus* (L., 1758)
- * *A. duodecimstriatus* (Schränk, 1781)
- * *A. corvinus* (Germar, 1817)

Platysoma Leach, 1817

- * *P. (P.) compressum* (Herbst, 1783)
- * *P. (Eurylistes) minor* (Rossi, 1792)
- * *P. (Cylister) elongatum* (Thunberg, 1787) (= *oblongum* F., 1792)

Hololepta Paykull, 1811

- * *H. (H.) plana* (Sulzer, 1776)

Histeridae Dendrophilinae

Dendrophilus Leach, 1817

- * *D. (D.) punctatus* (Herbst, 1792)

Carcinops Marseul, 1855

- * *C. (C.) pumilio* (Erichson, 1834)

Platylomalus De Cooman, 1948

- * *P. complanatus* (Panzer, 1797)

Paromalus Erichson, 1834

- * *P. (P.) flavicornis* (Herbst, 1792)
- * *P. (P.) parallelepipedus* (Herbst, 1792)

Histeridae Abraeinae

Plegaderus Erichson, 1834

- * *P. (P.) vulneratus* (Panzer, 1797)

Abraeus Laich, 1817

- * *A. (A.) perpusillus* (Marsham, 1802)

Acritus Le Conte, 1853

- * *A. minutus* (Herbst, 1792)
- * *A. nigricornis* (Hoffmann, 1803)

Chaetabraeus

- * *C. (Chaetabraeus) globulus* (Creutzer, 1799)

Chandolas centre (44°24,331'N ; 4°15,402'E), bovins, un exemplaire le 2 juillet 2011 (Elodie Rosinski *leg.*).

Histeridae Saprinae*Gnathoncus* Jacquelin Duval, 1858

- * *G. rotundatus* (Kugelann, 1792)
- [*G. nannetensis* (Marseul, 1862)]

Saprinus Erichson, 1834

- * *S. (S.) maculatus* (Rossi, 1790)
- * *S. (S.) semipunctatus* (F., 1792)
- * *S. (S.) deterius* (Illiger, 1807)
- * *S. (S.) semistriatus* (Scriba, 1790)
- * *S. (S.) subnitescens* Bickhardt, 1909
- * *S. (S.) furvus* Erichson, 1834
- * *S. (S.) tenuistrius* Marseul, 1855 subsp. *sparsutus* Solsky, 1876
- * *S. (S.) georgicus* Marseul, 1862
- * *S. (S.) aegialius* Brenske & Reitter, 1884 (= *incognitus* Dahlgren, 1964)

Chalcionellus Reichardt, 1932

- * *C. decemstriatus* (Rossi, 1792)

Hypocacculus Bickhardt, 1914

- * *H. (Nessus) rubripes* (Erichson, 1834)

Hypocaccus Thomson, 1867

- * *H. (H.) rugifrons* (Paykull, 1798)
- * *H. (H.) pelleti* (Marseul, 1862)
- * *H. (H.) crassipes* (Erichson, 1834)

Histeridae Onthophilinae*Onthophilus* Leach, 1817

- * *O. striatus* (Forster, 1771)
- [*O. globulosus* (Olivier, 1789)]

Hydrophilidae*Helophorus* F., 1775

- * *H. (Empleurus) rufipes* Bosc, 1791
- * *H. (H.) aquaticus* (L., 1758)
- * *H. (H.) flavipes* F., 1792 [= *viridicollis*]
- * *H. (Rhopalelophorus) brevipalpis* Bedel, 1881
- * *H. (R.) griseus* Herbst, 1793
- * *H. (R.) obscurus* Mulsant, 1844

Hydrochus Leach, 1817

- * *H. nitidicollis* Mulsant, 1844
- * *H. grandicollis* Kiesenwetter, 1870

Coelostoma Brullé, 1835

- * *C. orbiculare* (F., 1775)
- * *C. hispanicum* (Küster, 1848)

Sphaeridium F., 1775 (**page 156**)

- * *S. scarabaeoides* (L., 1758)
- * *S. substriatum* (Faldermann, 1838)
- * *S. bipustulatum* (F., 1781)

Cercyon Leach, 1817

- * *C. (Dicyrtocercyon) ustulatus* (Preyssler, 1790)
- * *C. (Cercyon) obsoletus* (Gyllenhal, 1808)
- * *C. (C.) melanocephalus* (L., 1758)
- * *C. (C.) haemorrhoidalis* (F., 1775)
- * *C. (C.) unipunctatus* (L., 1758)
- * *C. (C.) quisquilius* (L., 1761)
- * *C. (C.) terminatus* (Marsham, 1802)
- * *C. (Paracercyon) analis* (Paykull, 1798)

Megasternum Mulsant, 1844

- * *M. obscurum* (Marsham, 1802)

Cryptopleurum Mulsant, 1844

- * *C. minutum* (F., 1775)
- * *C. crenatum* (Panzer, 1794)

Paracymus Thomson, 1867

- * *P. scutellaris* (Rosenhauer, 1856)

Anacaena Thomson, 1859 (**page 157**)

- * *A. globulus* (Paykull, 1798)
- * *A. bipustulata* (Marsham, 1802)
- * *A. limbata* (F., 1792)
- * *A. lutescens* (Stephens, 1829)

Hydrobius Leach, 1815

- * *H. fuscipes* (L., 1758)

Laccobius Erichson, 1837

- * *L. (L.) biguttatus* Gerh., 1877
- * *L. (Dimorpholaccobius) neapolitanus* Rottenberg, 1874
- * *L. (D.) obscuratus* Rottenberg, 1874
- * *L. (D.) sinuatus* Motschoulsky, 1849
- * *L. (D.) atratus* Rottenberg, 1874
- * *L. (D.) atrocephalus* Reitter, 1872 subsp. *ytensis* Sharp, 1910
- * *L. (Microlaccobius) gracilis* Motschoulsky, 1855
- * *L. (Platylaccobius) mulsanti* Zaitzev, 1908
- * *L. striatulus* (F., 1801)

Helochares Mulsant, 1844

- * *H. (H.) lividus* (Förster, 1771)

Chaetarthria Stephens, 1835

- [*C. seminulum* Herbst, 1797]

Hydrophilus Müller, 1764

- * *H. (H.) pistaceus* (Laporte de Castelnau, 1840)

Berosus Leach, 1817 (**page 157**)

- * *B. (B.) signaticollis* (Charpentier, 1825)

Georyssus Latreille, 1794 (**page 230, à déplacer p. 157**)

- * *G. laesicollis* Germar, 1831
- * *G. costatus* Laporte de Castelnau, 1840
- * *G. caelatus* Erichson, 1847

LUCANOIDEA

Lucanidae

Sinodendron Hellwig, 1792 (**page 158**)

- * *S. cylindricum* (L., 1758)

Platycerus Fourcroy, 1785 (**page 158**)

- * *P. caraboides* (L., 1758)
- * *P. caprea* (DeGeer, 1774)

Dorcus Mac Leay, 1819

- * *D. parallelipipedus* (L., 1758)

Lucanus Scopoli, 1772 (**page 159**)

- * *L. cervus* (L., 1758)

SCARABAEOIDEA

Trogidae

Trox F., 1775 (**page 160**)

- * *T. perlatus* (Geoffroy, 1762)
- * *T. hispidus* (Pontoppidan, 1763)
- * *T. scaber* (L., 1767)

Geotrupidae

Typhaeus Leach, 1815 (**page 161**)

- * *T. typhaeus* (L., 1758)

Anoplotrupes Jekel, 1865

- * *A. stercorosus* (Scriba, 1791)

Geotrupes Latreille, 1796

- * *G. mutator* Marsham, 1802
- * *G. spiniger* Marsham, 1802
- * *G. stercorarius* (L., 1758)

Sericotrupes Zunino, 1984

- * *S. niger* (Marsham, 1802)

Trypocopris Motschoulsky, 1858

- * *T. vernalis* (L., 1758)
- * *T. pyrenaicus* (Charpentier, 1825)

Ochodeidae

Ochodeus Serville, 1825

- [*O. chrysomeloides* (Schränk, 1781)]

Aphodiidae

Aphodiinae

Aphodius Illiger, 1798 (**page 162**)

- * *A. (Colobopterus) erraticus* (L., 1758)
- * *A. (Copriformus) scrutator* (Herbst, 1789)
- * *A. (Eupleurus) subterraneus* (L., 1758)
- * *A. (Teuchestes) fossor* (L., 1758)
- * *A. (Otophorus) haemorrhoidalis* (L., 1758)
- * *A. (Plagiogonus) arenarius* (Olivier, 1789)
- * *A. (Ammonoecius) elevatus* (Olivier, 1789)
- * *A. (Trichonotulus) scrofa* (F., 1787)
- * *A. (Calamosternus) granarius* (L., 1767)
- * *A. (Euorodalus) paracoenosus* Balthasar & Hrubant, 1960
- * *A. (E.) coenosus* (Panzer, 1798)
- * *A. (Esymus) merdarius* (F., 1775)
- * *A. (E.) pusillus* (Herbst, 1789)
- * *A. (Eudolus) quadriguttatus* (Herbst, 1783)
- * *A. (E.) quadriguttatus* (Herbst, 1783)
- * *A. (Phalacronothus) biguttatus* Germar, 1824
- * *A. (P.) quadrimaculatus* (L., 1761)
- * *A. (Subrinus) sturmi* Harold, 1870
- * *A. (Aphodius) fimetarius* (L., 1758)
- * *A. (A.) foetens* (F., 1787)
- * *A. (A.) foetidus* (Herbst, 1783)
- * *A. (Bodilus) ictericus* (Laicharting, 1781)
- * *A. (Limarus) zenkeri* Germar, 1813
- * *A. (Oromus) alpinus* (Scopoli, 1763)
- [*A. (Acanthobodilus) immundus* (Creutzer, 1799)]
- * *A. (Agrilinus) constans* Duftschmid, 1805
- * *A. (A.) ater* (DeGeer, 1774)
- * *A. (A.) borealis* Gyllenhal, 1827
- * *A. (Parammoecius) corvinus* Erichson, 1848
- * *A. (Sigorus) porcus* (F., 1792)
- * *A. (Nimbus) contaminatus* (Herbst, 1783)
- * *A. (Chilothorax) paykulli* Bedel, 1907
- * *A. (C..) sticticus* (Panzer, 1798)
- * *A. (C.) distinctus* (Müller, 1776)
- * *A. (C.) melanostictus* W. Schmidt, 1840
- * *A. (Melinopterus) prodromus* (Brahm, 1790)
- * *A. (M.) sphacelatus* (Panzer, 1798)
- * *A. (M.) consputus* Creutzer, 1799
- * *A. (Acrossus) luridus* (F., 1775)
- * *A. (Acrossus) depressus* (Kugelann, 1792)
- * *A. (Acrossus) rufipes* (L., 1758)
- * *A. (Agolius) abdominalis* Bonelli, 1812

Oxyomus Dejean, 1833 (**page 166**)

- * *O. silvestris* (Scopoli, 1763)

Psammodiinae

Psammodius Fallén, 1807

- * *P. asper* (F., 1775)

Pleurophorus Mulsant, 1842

* *P. (P.) caesus* (Creutzer, 1796)

Rhyssemus Mulsant, 1842

* *R. germanus* (L., 1767)

[*R. verrucosus* Mulsant, 1842]

Scarabaeidae

Scarabaeinae

Gymnopleurus Illiger, 1803 (**page 167**)

† *G. sturmi* (Mac Leay, 1821) = 1 unique exemplaire connu, St*Alban*sous*Sampzon, le Bourbouillet, juillet 1958.

Scarabaeus L., 1758

* *S. typhon* Fischer von Waldheim, 1823

* *S. laticollis* L., 1767

Sisyphus Latreille, 1807

* *S. schaefferi* (L., 1758)

Coprinae

Copris Müller, 1776

* *C. lunaris* (L., 1758)

* *C. umbilicatus* Abeille de Perrin, 1901

Euoniticellus Janssens, 1953

* *E. fulvus* (Goeze, 1777)

Bubas Mulsant, 1842 (**page 168**)

* *B. bubalus* (Olivier, 1811)

Caccobius Thomson, 1863

* *C. schreberi* (L., 1767)

Euonthophagus Balthasar, 1959 (**page 173**)

* *E. amyntas* (Olivier, 1789)

* *E. gibbosus* (Scriba, 1790)

Onthophagus Latreille, 1802

* *O. (Furconthophagus) furcatus* (F., 1781)

* *O. (O.) illyricus* (Scopoli, 1763)

* *O. (O.) taurus* (Schreber, 1759)

* *O. (Palaeonthophagus) grossepunctatus* Reitter, 1905

* *O. (P.) joannae* Goljan, 1953

* *O. (P.) ovatus* (L., 1767)

* *O. (P.) ruficapillus* Brullé, 1832

* *O. (P.) coenobita* (Herbst, 1783)

* *O. (P.) fracticornis* (Preysler, 1790)

* *O. (P.) lemur* (F., 1781)

* *O. (P.) nuchicornis* (L., 1758)

* *O. (P.) semicornis* (Panzer, 1789)

* *O. (P.) similis* (Scriba, 1790) = *opacicollis*

* *O. (P.) vacca* (L., 1767)

- * *O. (P.) verticicornis* (Laicharting, 1781)
- * *O. (Parentius) emarginatus* Mulsant, 1842

Melolonthidae

Melolonthinae

- Anoxia* Laporte de Castelnau, 1832
- * *A. (A.) villosa* (F., 1781)
 - * *A. (Mesanoxia) australis* (Gyllenhal, 1817)

- Melolontha* F., 1775
- * *M. melolontha* (L., 1758)

- Polyphylla* Harris, 1842
- * *P. fullo* (L., 1758)

- Amphimallon* Lapeletier & Serville, 1825 (page 174)
- * *A. ochraceum* (Knoch, 1801)
 - * *A. solstitiale* (L., 1758)
 - * *A. atrum* (Herbst, 1790)
 - * *A. majale* (Razoumowsky, 1789)
 - * *A. ruficorne* (F., 1775)

- Rhizotrogus* Berthold, 1827
- * *R. marginipes* Mulsant, 1842
 - * *R. maculicollis* Villa, 1833
 - * *R. aestivus* (Olivier, 1789)
 - * *R. cicatricosus* Mulsant, 1842
 - * *R. vicinus* Mulsant, 1842

Sericinae

- Hymenoplia* Eschscholtz, 1830
- * *H. chevrolati* Mulsant, 1842

- Maladera* Mulsant & Rey, 1871
- * *M. holosericea* (Scopoli, 1772)

- Serica* MacLeay, 1819
- [*S. brunnea* (L., 1758)]

- Triodonta* Mulsant, 1842
- [*T. aquila* (Laporte de Castelnau, 1840)]
 - * *T. bucculenta* Baraud, 1962

Hopliidae

- Hoplia* Illiger, 1803
- * *H. (Decamera) farinosa* (L., 1761)
 - * *H. (H.) argentea* (Poda, 1761)
 - * *H. (H.) christinae* Baraud, 1967
 - * *H. (H.) coerulea* (Drury, 1773)

Rutelidae

Anisoplia Fischer von Waldheim, 1824

* *A. tempestiva* Erichson, 1847

* *A. remota* Reitter, 1889

* *A. villosa* (Goeze, 1777)

Anomala Samouelle, 1819 (**page 175**)

* *A. (A.) ausonia* Erichson, 1847

* *A. (A.) dubia* (Scopoli, 1763)

Blitopertha Reitter, 1903 (**page 176**)

* *B. lineolata* (Fischer von Waldheim, 1823) = *campestris*

Phyllopertha Stephens, 1830

* *P. horticola* (L., 1758)

Dynastidae

Oryctes Illiger, 1798 (**page 177**)

* *O. nasicornis* (L., 1758)

Pentodon Hope, 1837

* *P. bidens* (Pallas, 1771)

Phyllognathus Eschscholtz, 1830.

* *P. excavatus* (Forster, 1771)

Cetoniidae

Valginae

Valgus Scriba, 1790

* *V. hemipterus* (L., 1758)

Trichiinae

Osmoderma Serville, 1825

* *O. eremitum* (Scopoli, 1763) (débris d=1 ex., Casteljau)

Gnorimus Serville, 1825 (**page 178**)

* *G. variabilis* (L., 1758) = *octopunctatus*

* *G. nobilis* (L., 1758)

Trichius F., 1775

* *T. fasciatus* (L., 1758)

* *T. rosaceus* (Voët, 1769)

Cetoniinae

Cetonia F., 1775

* *C. aurata* (L., 1761)

Cetonischema Reitter, 1898

* *C. aeruginosa* (Drury, 1770) = *speciosissima*

Eupotosia Mikši, 1954.

* *E. affinis* (Andersch, 1797)

* *E. mirifica* (Mulsant, 1842) = *koenigi*

Liocola Thomson, 1859. (**page 179**)

- * *L. lugubris* (Herbst, 1786)

Netocia Costa, 1852 (**page 181**)

- * *N. (N.) morio* (F., 1781)
- * *N. (N.) oblonga* (Gory & Percheron, 1833)
- * *N. (Potosia) cuprea* (F., 1775) entre subsp. *olivacea* Mulsant et subsp. *metallica* (Herbst)
- * *N. (P.) cuprea* (F., 1775) subsp. *bourgini* (Ruter, 1967)
- * *N. (P.) fieberi* (Kraatz, 1880)
- * *N. (P.) opaca* (F., 1787)

Tropinota Mulsant, 1842

- * *T. hirta* (Poda, 1761)

Oxythyrea Mulsant, 1842

- * *O. funesta* (Poda, 1761)

MALACODERMOIDEA

Lymexylidae

Hylecoetus Latreille, 1806 (**page 182**)

- * *H. (H.) dermestoides* (L., 1761)

Drilidae

Drilus Olivier, 1790

- * *D. flavescens* (Geoffroy, 1785)

Homalidae

Homalus Geoffroy, 1762

- * *H. (H.) fontisbellaquei* Geoffroy, 1785

Lampyridae

Phausis Le Conte, 1853

- * *P. mulsanti* (Kiesenwetter, 1850)

Lampyris Geoffroy, 1762

- * *L. noctiluca* (L., 1758)

Nyctophila E. Olivier, 1884 (**page 183**)

- * *N. reichei* (Jacquelin Duval, 1859)

Lycidae

Dictyopterus Mulsant, 1838

- * *D. (Aplatopterus) rubens* (Gyllenhal, 1817)
- * *D. (D.) aurora* (Herbst, 1784)

Pyropterus Mulsant, 1838

- * *P. nigroruber* (DeGeer, 1774)

Platycis Thomson, 1864

* *P. minuta* (F., 1787)

Lygistopterus Mulsant, 1838

* *L. sanguineus* (L., 1758)

Cantharididae

Podabrus Westwood, 1838

* *P. alpinus* (Paykull, 1798)

Cantharis L., 1758

* *C. (Ancistronycha) abdominalis* F., 1798

* *C. (C.) rustica* Fallen, 1807

* *C. (C.) tristis* F., 1798

* *C. (C.) obscura* L., 1761

* *C. (C.) pulicaria* F., 1781

* *C. (C.) nigricans* Müller, 1764

* *C. (C.) livida* L., 1761

* *C. (C.) figurata* Mannherheim, 1843

Metacantharis Bourgeois, 1886

* *M. haemorrhoidalis* (F., 1792)

Rhagonycha Eschscholtz, 1830 (**page 184**)

* *R. (R.) nigriceps* (Waltl, 1838)

* *R. (R.) fulva* (Scopoli, 1763)

* *R. (R.) limbata* Thomson, 1864

* *R. (R.) femoralis* (Brullé, 1832)

* *R. (R.) lignosa* (Müller, 1764)

Malthinus Latreille, 1806

* *M. biguttulus* (Paykull, 1800)

* *M. flaveolus* (Paykull, 1800)

* *M. bilineatus* Kiesenwetter, 1852

* *M. seriepunctatus* Kiesenwetter, 1851

Malthodes Kiesenwetter, 1852

* *M. maurus* (Laporte de Castelnau, 1840)

HETEROMEROIDEA

Meloidae

Cerocoma Geoffroy, 1761

* *C. schaefferi* (L., 1758)

Zonabris Harold, 1879

* *Z. (Z.) geminata* (F., 1798)

* *Z. (Z.) duodecimpunctata* Olivier, 1811

* *Z. (Z.) variabilis* (Pallas, 1782)

* *Z. (Z.) quadripunctata* (L., 1766)

* *Z. (Z.) floralis* (Pallas, 1781)

Lytta F., 1775 (**page 185**)

* *L. vesicatoria* (L., 1758)

Meloe L., 1758 (**page 186**)

- * *M. (Proscarabaeus) proscarabaeus* L., 1758
- * *M. (P.) violaceus* Marsham, 1802
- * *M. (P.) autumnalis* (Olivier, 1792)
- * *M. (Eurymeloe) brevicollis* (Panzer, 1793)
- [*M. (E.) rugosus* Marsham, 1802]

Sitaris Latreille, 1802

- * *S. muralis* (Förster, 1771)

Stenoria Mulsant, 1857

- * *S. analis* Schaum, 1859
- [*S. apicalis* (Latreille, 1804)]

Zonitis F., 1775

- * *Z. immaculata* (Olivier, 1790)
- * *Z. praeusta* F., 1792

Tenebrionidae

Lagriinae

Lagria F., 1775 (**page 190**)

- * *L. hirta* (L., 1758)
- * *L. tristis* Bonelli, 1812

Agnathus Germar

- * *A. decoratus* Germar

Alleculinae

Allecula F., 1801

- * *A. morio* (F., 1787)

Prionychus Solier, 1835

- * *P. ater* (F., 1775)
- * *P. melanarius* (Germar, 1813)

Hymenalia Mulsant & Rey, 1856

- * *H. rufipes* (F., 1792)

Gonodera Mulsant & Rey, 1856

- * *G. luperus* (Herbst, 1783)

Isomira Mulsant & Rey, 1856

- * *I. murina* (L., 1758)
- * *I. antennata* (Panzer)

Mycetochara Berthold, 1827.

- * *M. axillaris* (Paykull, 1799)
- * *M. humeralis* (F., 1787)

Cteniopus Solier, 1835 (**page 191**)

- * *C. flavus* (Scopoli, 1763)

Omoplus Solier, 1835

- * *O. (s. str.) rugosicollis* (Brullé, 1832)
- * *O. (s. str.) rufitarsis* Leske, 1785
- * *O. (Odontomophlus) lepturoides* (F., 1787)

Diaperinae

- Boletophagus* Illiger, 1798
- * *B. reticulatus* (L., 1767)

- Diaperis* Geoffroy, 1764
- * *D. boleti* (L., 1758)

Hypophloeinae

- Corticeus* Piller & Mitterpacher, 1783
- * *C. (Paraphloeus) pini* Panzer, 1799 = *C. (P.) fraxini* Kugelan, 1794

Coelometopinae

- Menepphilus* Mulsant, 1854
- * *M. cylindricus* (Herbst, 1784)

Tenebrioninae

- Tenebrio* L., 1758
- * *T. (T.) obscurus* F., 1792
 - * *T. (T.) molitor* L., 1758
 - * *T. opacus* Duftschmid, 1812

- Helops* F., 1775
- * *H. coeruleus* (L., 1758)

- Stenomax* Allard, 1877
- * *S. (Asyrmatus) meridianus* (Mulsant, 1854)

- Nalassus* Mulsant, 1854
- * *N. dryadophilus* (Mulsant, 1854)
 - * *N. assimilis* (Küster, 1850)
 - * *N. ecoffeti* (Küstert, 1850)

- Lyphia* Mulsant & Rey, 1859
- * *L. tetraphylla* (Fairmaire, 1856)

- Tribolium* Mac Leay, 1825
- * *T. castaneum* (Herbst, 1797)

- Uloma* Latreille, 1829
- * *U. culinaris* (L., 1758)

- Alphitobius* Stephens, 1832
- * *A. diaperinus* (Panzer, 1797)

- Scaphidema* Redtenbacher, 1849
- * *S. metallicum* (F., 1792)

Platydemus Laporte de Castelnau & Brullé, 1831

* *P. europaeum* Laporte de Castelnau & Brullé, 1831

* *P. violaceum* (F., 1790)

Alphitophagus Stephens, 1832 (**page 189**)

* *A. bifasciatus* (Say, 1823)

Pentaphyllus Latreille, 1829

* *P. chrysomeloides* (Rossi, 1792)

Crypticus Latreille, 1817

* *C. quisquilius* (L., 1761)

Dendarus Latreille, 1829

* *D. tristis* Laporte de Castelnau, 1840

Phylan Stephens, 1832 (**page 188**)

* *P. abbreviatus* (Olivier, 1795)

Gonocephalum Solier, 1834

* *G. (G.) pygmaeum* (Steven, 1829)

* *G. granulatum* subsp. *nigrum* Küster, 1849 cité parfois par erreur comme *pusillum* (F., 1791), espèce d'Europe de l'Est qui n'existe pas en France.

* *G. rusticum* (Olivier, 1811)

Opatrum F., 1775

* *O. sabulosum* (L., 1761)

Blaps F., 1775

* *B. (Leptoblaps) gigas* (L., 1767)

* *B. (Agroblaps) lethifera* Marsham, 1802

* *B. (Leptocolena) mucronata* Latreille, 1804

Tentyriinae

Akis Herbst, 1799 (**page 187**)

† *A. bacarozzo* (Schränk, 1786) (1 ex., Villeneuve*de*Berg, sept. 1959)

Asida Latreille, 1802

* *A. (Polasida) jurinei* Solier, 1836

* *A. (P.) sericea* (Olivier, 1795)

* *A. (A.) sabulosa* (Fueslin, 1775)

A. (A.) dejeani Solier, 1836 (BSA, avr. 1945 & 1 ex., St*André*de*Cruzières, sept. 1961)

Dichillus Jacquelin Duval, 1861

* *D. minutus* (Solier, 1838)

Melandryidae

Hallomenus Panzer, 1794

* *H. axillaris* (Illiger, 1807)

Orchesia Latreille, 1807

[*O. micans* (Panzer, 1794)]

Xylita Paykull, 1798 (**page 192**)

* *X. livida* (Sahlberg, 1834)

Serropalpus Hellenius, 1786
 * *S. barbatus* (Schaller, 1783)

Melandrya F., 1801
 * *M. caraboides* (L., 1761)

Conopalpus Gyllenhal, 1810
 * *C. brevicollis* Kraatz, 1855

Pythidae

Rabocerus Mulsant, 1859
 * *R. (Colposis) mutilatus* Champion, 1886

Rhinosimus Latreille, 1804
 * *R. (R.) planirostris* (F., 1787)
 * *R. aeneus* (Olivier, 1807)

Mycterus Olivier, 1806
 * *M. (M.) curculionoides* (F., 1781)

Pyrochroidae

Pyrochroa DeGeer, 1775
 * *P. (P.) coccinea* (L., 1761)
 * *P. (P.) serraticornis* (Scopoli, 1763)

Salpingidae

Salpingus Gyllenhal, 1810
 * *S. reyi* Abeille de Perrin, 1874

Anthicidae

Formicomus Laferté*Sénectère, 1848 (**page 193**)
 * *F. pedestris* (Rossi, 1790)

Notoxus Geoffroy, 1761
 * *N. cavifrons* Laferté*Sénectère, 1848
 * *N. trifasciatus* Rossi, 1792
 * *N. monoceros* (L., 1761)

Mecynotarsus Laferté*Sénectère, 1848
 * *M. serricornis* (Panzer, 1796)

Leptaleus Laferté*Sénectère, 1848
 * *L. rodriguesi* (Latreille, 1802)

Hirticomus Oic, 1894
 * *H. quadriguttatus* (Rossi, 1792)
 * *H. hispidus* (Rossi, 1792)

Omonadus Mulsant & Rey, 1866
 * *O. floralis* (L., 1758)
 * *O. bifasciatus* (Rossi, 1792)

- * *O. luteicornis* Schmidt, 1842
- * *O. fuscicornis* Laferté*Sénectère, 1848
- * *O. laeviceps* (Baudi, 1777)

Anthicus Paykull, 1798

- * *A. (Nodolinus) optabilis* Laferté*Sénectère, 1848
- * *A. (N.) longicollis* Schmidt, 1842
- * *A. (N.) transversalis* Villa, 1833
- * *A. (Anthicus) quadrioculatus* La Ferté, 1848
- * *A. (Cordicomus) instabilis* (Schmidt, 1842)
- * *A. (C.) gracilis* (Panzer, 1787)

Microhoria (Chevrolat, 1877)

- * *M. fasciata* (Chevrolat, 1838)

Endomia Castelnau, 1840 (**page 194**)

- * *E. tenuicollis* (Rossi, 1799)
- * *E. occipitalis* Léon Dufour, 1843
- * *E. unifasciatus* (Bonnelli, 1812)

Hylophilidae

Hylophilus Berthold, 1825 (**page 195**)

- * *H. (Anidorus) sanguinolentus* Kiesenwetter, 1861
- * *H. (Olotelus) pruinus* Kiesenwetter, 1861
- * *H. nigrinus* Germar, 1831

Mordellidae

Tomoxia Costa, 1853

- * *T. biguttata* (Gyllenhal, 1827)

Hoshihananomia Kôno, 1935

- * *H. gacognei* (Mulsant, 1852)

Variimorda Méquignon, 1946

- * *V. fasciata* (F., 1775)
- * *V. mendax* Méquignon, 1946

Mordella L., 1758

- * *M. brachyura* Mulsant & Rey, 1856
- * *M. leucaspis* Küster, 1849
- * *M. aculeata* L., 1758
- * *M. hütheri* Ermisch, 1957
- * *M. holomelaena* Apfelbeck, 1914

Mordellochroa Emery, 1876

- * *M. tournieri* Emery, 1876
- * *M. freyi* Ermisch

Mordellistena Costa, 1853 (**page 196**)

- [*M. parvula* (Gyllenhal, 1827)]
- * *M. episternalis* Mulsant, 1856
- * *M. pyrenaea* Ermisch, 1966
- * *M. pseudohirtipes* Ermisch, 1965
- * *M. brevicauda* (Boheman, 1848)

- [*M. micans* (Germar, 1817)]
- * *M. purpurascens* Costa, 1854
- [*M. pumila* (Gyllenhal, 1810)]
- * *M. tarsata* Mulsant, 1856
- [*M. trilineata* Mulsant, 1856]
- * *M. neuwaldeggiana* (Panzer, 1796)
- * *M. intersecta* Mulsant, 1856
- * *M. pentas* Mulsant, 1856
- * *M. thuringiaca* Ermisch, 1963
- * *M. purpureonigrans* Ermisch, 1963
- M. balazuci* Ermisch, 1966 (une , Bois de Païolive, 15 août 1960)
- * *M. geronensis* Ermisch
- * *M. abdominalis* (F. , 1775)
- * *M. lateralis* (Olivier, 1795)

Anaspididae

- Pentaria* Mulsant, 1856 (**page 197**)
- * *P. desfarguesi* (Abeille, 1885)

Anaspis Geoffroy, 1762

- * *A. (A.) pulicaria* Costa, 1854
- * *A. (A.) ruficollis* (F., 1785)
- * *A. (A.) geoffroyi* Müller, 1821
- * *A. (A.) maculata* Geoffroy, 1785
- * *A. (A.) frontalis* (L., 1758)
- * *A. (A.) subtestacea* Stephens, 1832
- * *A. (A.) geoffroyi* Müller, 1821
- * *A. (Nassipa) flava* (L., 1758)
- * *A. (Silaria) quadrimaculata* (Gyllenhal, 1817)
- * *A. (S.) varians* Mulsant & Rey, 1856

Rhipiphoridae

- Evaniocera* Guérin*Méneville, 1837 (**page 198**)
- * *E. dufouri* (Latreille, 1817)

Macrosiagon Hentz, 1830

- * *M. tricuspidatum* (Lepechin, 1774)
- * *M. ferrugineum* (F., 1775) *flabellatum* (F., 1781)
- * *M. praeustum* (Gebler, 1830)

Rhipiphorus Bosc, 1792

- * *R. subdipterus* Bosc, 1792

Scraptiidae

Scraptia Latreille, 1807

- * *S. dubia* (Olivier, 1790)

Trotomma Kiesenwetter, 1851

- * *T. pubescens* Kiesenwetter, 1851

Oedemeridae

Calopus F., 1775

* *C. serraticornis* (L., 1758)

Xanthochroa Schmidt, 1846 (**page 199**)

* *X. carniolica* (Gistl., 1832)

Nacerda Stephens, 1839

* *N. (Anoncodina) dispar* (L. Dufour, 1841)

Ischnomera Stephens, 1832

* *I. (I.) sanguinicollis* (F., 1787)

* *I. (Asclera) caerulea* (L., 1758)

* *I. cinerascens* (Pandellé, 1867)

Chrysanthia Schmidt, 1846

* *C. viridissima* (L., 1758)

Oncomera Stephens, 1832

* *O. femorata* (F., 1792)

Oedemera Olivier, 1795

* *O. (Oedemerina) flavipes* (F., 1792)

* *O. (Oedemera) podagrariae* (L., 1767)

* *O. (O.) subulata* (Olivier, 1794)

* *O. (O.) tristis* W. Schmidt, 1846

* *O. (O.) nobilis* (Scopoli, 1763)

* *O. (Oedemerina) virescens* (L., 1767)

* *O. (Oedemerina) lurida* Marsham, 1802

CLEROIDEA

Cleridae

Denops Fischer von Waldheim, 1829

* *D. albofasciatus* (Charpentier, 1825)

Tillus Olivier, 1790 (**page 200**)

* *T. unifasciatus* (F., 1787)

Opilo Latreille, 1804

* *O. domesticus* Sturm, 1837

* *O. pallidus* (Olivier, 1795)

Pseudoclerops Jacquelin Duval, 1861

* *P. mutillarius* (F., 1775)

Thanasimus Latreille, 1806

* *T. formicarius* (L., 1757)

Trichodes Herbst, 1792

* *T. leucopsideus* (Olivier, 1795)

* *T. apiarius* (L., 1758)

* *T. alvearius* (F., 1792)

Tarsostenus Spinola, 1844

* *T. univittatus* Rossi, 1792

Corynetes Herbst, 1790

- * *C. caeruleus* (DeGeer, 1775)
- * *C. ruficornis* Sturm, 1837

Necrobia Latreille, 1809 (**page 201**)

- * *N. (N.) ruficollis* (F., 1775)
- * *N. (N.) violacea* (L., 1758)
- * *N. (Agonolia) rufipes* (DeGeer, 1775)

Melyridae*Hypebaeus* Kiesenwetter, 1863

- * *H. flavicollis* Erichson, 1840

Charopus Erichson, 1840

- * *C. pallipes* (Olivier, 1798)
- [*C. docilis* Kiesenwetter, 1851]

Colotes Erichson, 1840

- * *C. (Homoeodipnis) javeti* Jacquelin Duval, 1852

Ebaeus Erichson, 1840

- * *E. thoracicus* (Olivier, 1790)

Attalus Erichson, 1840

- * *A. (Abrinus) analis* Erichson, 1840
- * *A. (Antholinus) varitarsis* Kraatz, 1862

Axinotarsus Motschoulsky, 1840

- * *A. pulicarius* (F., 1787)
- * *A. marginalis* (Laporte de Castelnau, 1840)

Malachius F., 1775 (**page 202**)

- * *M. (Clanoptilus) rufus* (Olivier, 1782)
- [*M. (C.) marginellus* (Olivier, 1790)]
- * *M. (C.) arnaizi* Pardo, 1966
- * *M. (C.) elegans* (Olivier, 1790)
- * *M. (C.) affinis* Mén., 1832
- * *M. (M.) scutellaris* (Erichson, 1840)
- * *M. (M.) bipustulatus* (L., 1758)
- * *M. (M.) viridis* F., 1787
- * *M. (M.) dentifrons* (Erichson, 1840)
- * *M. (Micrinus) inornatus* Küster, 1846
- * *M. ambiguus* Peyron, 1877
- * *M. geniculatus* Germar, 1824

Anthocomus Erichson, 1840 (**page 203**)

- * *A. (Celidus) coccineus* (Schaller, 1783)
- * *A. (Neotrotus) bipunctatus* (Harrer, 1784)

Henicopus Stephens, 1830

- * *H. (H.) pilosus* (Scopoli, 1763)
- * *H. (H.) falculifer* Fairmaire, 1859
- * *H. (H.) pyrenaeus* Fairmaire, 1859

Divales Laporte de Castelnau, 1836

* *D. bipustulatus* (F., 1781)

Dasytes Paykull, 1799

- * *D. (D.) niger* (L., 1761)
- * *D. (D.) tristiculus* Mulsant & Rey, 1868
- * *D. (Mesodasytes) flavipes* (Olivier, 1790)
- * *D. (Mesodasytes) aerosus* Kiesenwetter, 1867
- * *D. (Metadasytes) caeruleus* (DeGeer, 1774)
- * *D. (Metadasytes) pilicornis* Kiesenwetter, 1864
- * *D. subaeneus* Schönherr, 1817
- * *D. plumbeus* (Müller, 1776)

Psilothrix Redtenbacher, 1858 (**page 204**)

- * *P. viridicaeruleus* (Geoffroy, 1785)

Haplocnemus Stephens, 1830

- * *H. pini* (Redtenbacher, 1849)
- * *H. nigricornis* (F., 1792)
- * *H. virens* (Suffrian, 1843)
- * *H. alpestris* Kiesenwetter, 1849

Trichoceble Thomson, 1864

- * *T. floralis* (Olivier, 1790)

Danacaea Laporte de Castelnau, 1836 (**page 205**)

- * *D. pallipes* (Panzer, 1794)
- * *D. longiceps* Mulsant & Rey, 1868
- * *D. nigratarsis* (Küster, 1850)
- [*D. nigricornis* (F., 1792)]

DASCILLOIDEA

Dascillidae

Dascillus Latreille, 1796

- * *D. cervinus* (L., 1758)

Scirtidae (= AHelodidae@)

Cyphon Paykull, 1798

- * *C. variabilis* (Thunberg, 1785)

Helodes Latreille, 1796

- * *H. minuta* (L., 1767)
- * *H. chrysocoma* Abeille, 1872
- * *H. marginata* F., 1798

Eubriidae (= APsephenidae@)

Eubria Latreille, 1829

- * *E. palustris* (Germar, 1818)

Cebrionidae

Cebrio Olivier, 1790

- * *C. gigas* (F., 1774)

Cerophytidae

Cerophytum Latreille, 1804 (**page 206**)

* *C. elateroides* (Latreille, 1809)

Coux, côte chaude, piège lumineux, VI. 2005., 1 ex., C.S. Espèce saproxylique très rare, répandue de la Slovaquie à la France.

Eucnemidae

Melasis Olivier, 1790

* *M. buprestoides* (L., 1761)

Hypocoelus Guérin, 1843

* *H. cariniceps* (Reitter, 1902)

Eucnemis Ahrens, 1812

* *E. capucina* Ahrens, 1812

Dirrhagus Latreille, 1834

* *D. (Rhacopus) sahlbergi* (Mannerheim, 1823)

* *D. emyi* (Rouget, 1855)

Throscidae

Drapetes Redtenbacher, 1849

* *D. biguttatus* (Piller & Mitterpacher, 1783)

Elateridae

Lacon Laporte de Castelnau, 1836

* *L. punctatus* (Herbst, 1779)

Adelocera Latreille, 1829

* *A. murina* (L., 1758)

Drasterius Eschscholtz, 1829 (**page 207**)

* *D. bimaculatus* (Rossi, 1790)

Ampedus Germar, 1844

* *A. erythrogonus* (Ph. W. Müller, 1821)

* *A. rufipennis* (Stephens, 1830)

* *A. balteatus* (L., 1758)

* *A. praeustus* (F., 1792)

* *A. cardinalis* (Schiödte, 1835)

* *A. sanguineus* (L., 1758)

* *A. cinnabarinus* (Eschscholtz, 1829)

[*A. aurilegulus* (Schaufuss, 1863)]

* *A. sanguinolentus* (Schrank, 1776)

* *A. corsicus* Reitter, 1918

* *A. pomorum* (Herbst, 1784)

* *A. elongatulus* (F., 1787)

* *A. nigrinus* (Herbst, 1784)

* *A. bouyoni* Chassain, 1992

* *A. megerlei* (Lacordaire, 1835)

* *A. dubius* (Platia & Cate, 1990)

* *A. nigerrimus* (Lacordaire, 1835)

* *A. nigroflavus* (Goeze, 1777)

Ischnodes Germar, 1844

* *I. sanguinicollis* (Panzer, 1793)

Hypnoidus Dillwyn, 1829

* *N. riparius* (F., 1792)

[*H. rivularius* (Gyllenhal, 1808)]

Fleutiauxellus Méquignon, 1930 (**page 208**)

* *F. quadripustulatus* (F., 1792)

Negastrius Thomson, 1859

* *N. pulchellus* (L., 1761)

* *N. sabulicola* (Boheman, 1851)

Zorochrus Thomson, 1859

* *Z. curtus* (Germar, 1844)

* *Z. meridionalis* (Laporte de Castelnau, 1840)

* *Z. quadriguttatus* (Laporte de Castelnau, 1840)

* *Z. flavipes* (Aubé, 1850)

* *Z. dermestoides* (Herbst, 1806)

Cardiophorus Eschscholtz, 1829

* *C. rufipes* (Goeze, 1777)

* *C. erichsoni* Buyss., 1901

* *C. gramineus* (Scopoli, 1763)

* *C. ruficollis* (L., 1758)

* *C. biguttatus* (Olivier, 1790)

* *C. nigerrimus* Erichson, 1840

* *C. vestigialis* Erichson, 1840

Dicronychus Brullé, 1832 (**page 209**)

* *D. equiseti* (Herbst, 1784)

Paracardiophorus Schwarz, 1895

* *P. musculus* (Erichson, 1840)

Melanotus Eschscholtz, 1829

* *M. rufipes* (Herbst, 1784)

* *M. castanipes* (Paykull, 1800)

* *M. tenebrosus* (Erichson, 1841)

* *M. crassicollis* (Erichson, 1841)

* *M. niger* (F., 1792)

Betarmon Kiesenwetter, 1858

[*B. ferrugineus* (Scopoli, 1763)]

Idolus Desbrochers des Loges, 1875

* *I. picipennis* (Bach, 1852)

Cidnopus Thomson, 1859 (**page 210**)

* *C. pilosus* (Leske, 1785)

* *C. aeruginosus* (Olivier, 1790)

* *C. minutus* (L., 1758)

* *C. parvulus* (Panzer, 1799)

Limenius Eschscholtz, 1829

- * *L. aeneoniger* (DeGeer, 1774)
- * *L. quercus* (Olivier, 1790)

Stenagostus Thomson, 1859

- * *S. villosus* (Fourcroy, 1785)
- * *S. rufus* (DeGeer, 1774)

Harminius Fairmaire, 1852

- * *H. undulatus* (DeGeer, 1774)

Athous Eschscholtz, 1829

- * *A. (Pseudathous) hirtus* (Herbst, 1784)
- * *A. (A.) puncticollis* Kiesenwetter, 1858

Espèce connue seulement du sud-est de la France : le Gard et l'Ardèche marquent sa limite occidentale et au sud de l'Ardèche, de la Drôme et des hautes-Alpes sa limite septentrionale.

- * *A. (A.) vittatus* (F., 1792)

Presque tous les départements français. Espèce banale, bien distincte de la précédente (Leseigneur *et al.*, 2010).

- * *A. (A.) haemorrhoidalis* (F., 1801)
- * *A. (Exanathrotus) subfuscus* (O. F. Müller, 1767)
- * *A. (Haplathous) villiger* Mulsant & Guillebeau, 1855
- * *A. (Euplathous) dejeani* (Laporte de Castelnau, 1840)
- * *A. (E.) frigidus* Mulsant & Guillebeau, 1855
- * *A. (Orthathous) chamboveti* Mulsant Godart, 1867
- * *A. (O.) herbigradus* Mulsant & Guillebeau, 1855
- * *A. (O.) difformis* Boisduval & Lacordaire, 1835
- [*A. (Grypethous) subtruncatus* Mulsant & Guillebeau, 1856]
- * *A. (G.) tomentosus* Mulsant & Guillebeau, 1855

Ctenicera Latreille, 1829 (**page 212**)

- * *C. (C.) pectinicornis* (L., 1758)
- * *C. (C.) cuprea* (F., 1781)

Anostirus Thomson, 1859 (**page 213**)

- * *A. (Parastirus) purpureus* (Poda, 1761)
- [*A. (Pseudostirus) sulphuripennis* (Germar, 1843)]
- * *A. (Ipostirus) pseudosulphuripennis* Binaghi, 1940

Actenicerus Kiesenwetter, 1858

- * *A. sjaelandicus* (O.F. Müller, 1764)

Selatosomus Stephens, 1830

- [*S. (S.) impressus* (F., 1792)]
- * *S. (S.) amplipennis* (Germar, 1843)
- * *S. (S.) aeneus* (L., 1758)
- * *S. (S.) latus* (F., 1801)
- * *S. (S.) nigricornis* (Panzer, 1799)
- * *S. (Poemnites) aeratus* Mulsant & Guillebeau, 1856
- * *S. (Haplotarsus) affinis* (Paykull, 1800)

Prosternon Latreille, 1834

- * *P. tessellatum* (L., 1758)

Hypoganus Kiesenwetter, 1858

- * *H. cinctus* (Paykull, 1800)

Elater L., 1758 (**page 214**)

- * *E. ferrugineus* L., 1758

Agriotes Eschscholtz, 1829

- * *A. (Agriodrastus) pallidulus* (Illiger, 1807)
- * *A. (Agriotes) pilosellus* (Schönherr, 1817)
- * *A. (A.) ustulatus* Schaller, 1783)
- [*A. (A.) litigiosus* (Rossi, 1792)]
- * *A. (A.) gallicus* Boisduval & Lacordaire, 1835
- * *A. (A.) sputator* (L., 1758)
- * *A. (A.) sordidatus* (Illiger, 1807)
- * *A. (A.) obscurus* (L., 1758)
- * *A. (A.) lineatus* (L., 1767)

Dalopius Eschscholtz, 1829

- * *D. marginatus* (L., 1758)

Sericus Eschscholtz, 1829

- * *S. brunneus* (L., 1758)

Synaptus Eschscholtz, 1829

- * *S. filiformis* (F., 1781)

Silesis Candèze, 1863 (**page 215**)

- * *S. rutilipennis* (Illiger, 1807)

Adrastus Eschscholtz, 1829 (page 215)

- * *A. limbatus* (F., 1776)
- * *A. pallens* (F., 1790)
- * *A. rachifer* (Fourcroy, 1785)

Denticollis Piller & Mitterpacher, 1783

- * *D. rubens* Piller & Mitterpacher, 1783
- * *D. linearis* (L., 1758)

Buprestidae**Acmaeoderinae***Acmaeodera* Eschscholtz, 1829

- * *A. pilosellae* (Bonelli, 1812)
- * *A. bipunctata* (Olivier, 1790)
- * *A. prunneri* Gené, 1839 & *A. prunneri octodecimpunctata* Gory

prunneri sensu stricto en Vallée de l'Ibie (en rive gauche à Lagorce et à Vallon : fin juin, juillet), Labeaume, *octodecimpunctata* à Païolive (Montchamp : deux ex sur fleur jaune en août 1977 ; Granzon : un ex au fauchage le 18 juin 2005)

Acmaeoderella Cobos, 1955

- * *A. (A.) adspersula* (Illiger, 1803)
- * *A. (A.) flavofasciata* (Piller & Mitterpacher, 1783)

Polycestinae*Ptosima* Solier, 1833 (**page 216**)

- * *P. flavoguttata* (Illiger, 1803)

Sphenopterinae

Sphenoptera Solier, 1833

- * *S. (S.) antiqua* (Illiger, 1803)
- * *S. (Chilostetha) laportei* Saunders, 1871

Chalcophorinae

Chalcophora Solier, 1833

- * *C. massiliensis* (Villers, 1789)

Capnodis Eschscholtz, 1829

- * *C. tenebricosa* (Olivier, 1790)
- * *C. tenebrionis* (L., 1761)

Latipalpis Solier, 1833

- * *L. plana* (Olivier, 1790)

Païolive : ermitage Saint-Eugène, septembre 2004, un individu mort (J.F.H. *leg.*).

Buprestinae

Dicerca Eschscholtz, 1829 (**page 217**)

- * *D. (D.) aenea* (L., 1761)
- * *D. (D.) berlinensis* (Herbst, 1779)
- * *D. (D.) alni* (Fischer von Waldheim, 1824)

Descarpentriesina Leraut, 1983

- * *D. variolosa* (Paykull, 1799)

Poecilonota Eschscholtz, 1829

- * *P. mirifica* (Mulsant, 1855)
- * *P. dives* (Guillebeau, 1889)

Dendrochariessa Gistel, 1848 (= *Ovalisia* = *Scintillatrix* = *Lampra*)

- *D. festiva* (L., 1767)

Eurythyrea Lacordaire, 1835

- * *E. quercus* (Herbst, 1790)
- * *E. micans* (F., 1794)

Buprestis L., 1758 (**page 218**)

- * *B. haemorrhoidalis* Herbst, 1780
- * *B. novemmaculata* L., 1767
- * *B. octoguttata* L., 1758

Kisanthobia De Marseul, 1865

- * *K. ariasi* Robert, 1858

Trachypteris Kirby, 1837 (= *Melanophila*)

- * *T. picta* (Pallas, 1773)

Melanophila Eschscholtz, 1829 (= *Phaenops*)

- * *M. cyanea* (F., 1774)
- * *M. formaneki* (Jakobson, 1912)

Anthaxia Eschscholtz, 1829

- * *A. (Cratomerus) hungarica* (Scopoli, 1772)
- * *A. (A.) manca* (L., 1767)
- * *A. (A.) salicis* (F., 1777)
- * *A. (A.) semicuprea* Küster, 1851
- * *A. (A.) fulgurans* (Schrank, 1789)
- * *A. (A.) nitidula* (L., 1758)
- * *A. (A.) hypomelaena* (Illiger, 1803)
- * *A. (A.) funerula* (Illiger, 1803)
- * *A. (A.) mendizabali* Cobos, 1965
- * *A. (Haplantaxia) millefolii* (F., 1801)
- * *A. (H.) umbellatarum* (F., 1787)
- * *A. (H.) confusa* Gory, 1841
- * *A. (H.) cichorii* (Olivier, 1790)
- * *A. (H.) scutellaris* Gené, 1839
- * *A. (H.) parallela* Castelnau & Gory, 1835-1840
- * *A. (H.) ignipennis* Abeille, 1882
- * *A. (Melanthaxia) helvetica* Stierlin, 1868
- * *A. (M.) sepulchralis* (F., 1801)
- * *A. (M.) nigritula* Ratzeburg, 1839
- * *A. (M.) quadripunctata* (L., 1758)
- * *A. (M.) godeti* Laporte de Castelnau & Gory, 1847

Chrysobothrinae*Chrysobothris* Eschscholtz, 1829 (**page 220**)

- * *C. chrysostigma* (L., 1758)
- * *C. affinis* (F., 1794)
- * *C. solieri* Laporte de Castelnau & Gory, 1893

Agrilinae*Coroebus* Laporte de Castelnau & Gory, 1839

- * *C. florentinus* (Herbst, 1801)
- * *C. undatus* (F., 1787)
- * *C. rubi* (L., 1767)
- * *C. elatus* (F., 1787) = *aeruginosus*

Meliboeus H. Deyrolle, 1864 (**page 221**)

- * *M. (Meliboeoides) amethystinus* (Olivier, 1790)

Vallon-Pont-d'Arc, vallée de l'Ibie, juillet 1973, 1 ex.

[*M. (Meliboeus) gibbicollis* (Illiger, 1803)]

- * *M. (M.) graminis* (Panzer, 1789)

[*M. (Melixes) aeratus* (Mulsant & Rey, 1863)]

Nalanda Théry, 1904

- * *N. fulgidicollis* (Lucas, 1849)

Agrilus Curtis, 1825

- * *A. (Uragrilus) guerini* Lacordaire, 1835

Une femelle pondant en fin d'après-midi sur *Salix alba*, Grospierrres, 5 juillet 1984. Villeneuve-de-Berg, vallée de l'Ibie, une autre femelle sur feuille d'un jeune plant de *Salix alba* le 7 juillet 1984 ; une autre ♀ dans la même station le 9 juillet 1984 (G. Liskenne). Grospierrres, juin 1985 (L. Leseigneur, R. Vincent).

- * *A. (U.) ater* (L., 1767)

- * *Agrilus (Anambus) auricollis* Kiesenwetter, 1857

(P.B.)

- * *A. (Agrilus) biguttatus* (F., 1777)
- * *A. (A.) ribesii* Schaefer, 1946
- * *A. (A.) obscuricollis* Kiesenwetter, 1857
- * *A. (A.) sulcicollis* Lacordaire, 1835
- * *A. (A.) laticornis* (Illiger, 1803)
- * *A. (A.) hastulifer* Ratzeburg, 1839
- * *A. (A.) graminis* Laporte de Castelnau & Gory, 1837
- * *A. (A.) convexicollis* Redtenbacher, 1849

Une femelle dans une chênaie, juillet 1992 (G. Liskenne)

- * *A. (A.) cyanescens* Ratzeburg, 1837
- * *A. (A.) pseudocyaneus* Kiesenwetter, 1857
- * *A. (A.) viridis* (L., 1758)
- * *A. (A.) angustulus* (Illiger, 1803)
- * *A. (A.) suvorovi* Obenberger, 1935
- * *A. (A.) betuleti* Ratzeburg, 1837
- * *A. (A.) elegans* Mulsant & Rey, 1863
- * *A. (A.) derasofasciatus* Lacordaire, 1835
- * *A. (A.) aurichalceus* Redtenbacher, 1849
- * *A. (A.) integerrimus* Ratzeburg, 1839
- * *A. (A.) sinuatus* (Olivier, 1790)
- * *A. (A.) roscidus* Kiesenwetter, 1857
- * *A. (A.) hyperici* (Creutzer, 1799)
- * *A. (A.) albogularis* Gory, 1841
- * *A. (A.) antiquus* Mulsant & Rey, 1863
- * *A. (A.) cinctus* (Olivier, 1790)
- * *A. (Robertius) pratensis* Ratzeburg, 1837

Cylindromorphinae

Paracylindromorphus Théry, 1928 (**page 222**)

- * *P. subuliformis* (Mannerheim, 1837)

Aphanisticus Latreille, 1810 (**page 223**)

- * *A. emarginatus* (Olivier, 1792)
- * *A. elongatus* Villa, 1835
- * *A. angustatus* Lucas, 1849

Trachys F., 1801

- * *T. minutus* (L., 1758)
- * *T. coruscus* Ponza, 1805 = *fabricii*
- * *T. quercicolus* Marseul, 1871
- * *T. scrobiculatus* Kiesenwetter, 1857
- * *T. troglodytes* Gyllenhal, 1817 = *aenea* = *aeneus*

Habroloma Thomson, 1864

- * *H. geranii* Silfverberg, 1977 = *nana* = *nanum*
- * *H. triangularis* (Lacordaire, 1835) = *triangulare*

Anobiidae

Hedobia Latreille, 1829 (**page 224**)

- * *H. (Ptinomorphus) imperialis* (L., 1777)

Dryophilus Chevrolat, 1832

- * *D. anobioides* Chevrolat, 1832

Xestobium Motschoulsky, 1845

* *X. (X.) rufovillosum* (DeGeer, 1774)

Coelostethus Le Conte, 1861

* *C. pertinax* (L., 1758)

Hadrobregmus Thomson, 1863

* *H. nitidus* (F., 1792)

* *H. costatus* (Aragona, 1830)

Oligomerus Wollaston, 1854

* *O. (Oligomerinus) ptilinoides* Wollaston, 1854

Nicobium Le Conte, 1861

* *N. castaneum* (Olivier, 1790)

Stegobium Motschoulsky, 1860 (page 224)

* *S. paniceum* (L., 1761)

Lasioderma Stephens, 1832

* *L. (L.) redtenbacheri* Bach., 1852

Ptinidae

Gibbium Scopoli, 1777

* *Gibbium psylloides* (Czempinski, 1778)

Lagorce, 14 septembre 2000, P. Lentenois *leg.*, 1 ex.

Niptus Boïeldieu, 1856 (**page 225**)

* *N. (N.) hololeucus* (Faldermann, 1836)

Tipnus Thomson, 1863

[*T. unicolor* (Piller, 1782)]

Ptinus L., 1766

* *P. (Bruchoptinus) italicus* Aragona, 1830

* *P. (P.) fur* (L., 1758)

* *P. (P.) pusillus* Sturm, 1837

* *P. (P.) testaceus* Olivier, 1790

* *P. (P.) subpilosus* Sturm, 1837

* *P. (Gynopterus) aubei* Boïeldieu, 1854

* *P. (Cyphoderes) raptor* Sturm, 1837

* *P. (C.) bidens* Olivier, 1790

CUCUJOIDEA

Dermestidae

Dermestes L., 1758

* *D. vulpinus* F., 1781

* *D. frischii* Kugelann, 1792

* *D. murinus* L., 1758

* *D. lanarius* Illiger, 1802

* *D. mustelinus* Erichson, 1846

* *D. undulatus* Brahm, 1790

* *D. aurichalceus* Küster, 1846

- * *D. lardarius* L., 1758
- * *D. olivieri* Lepesme, 1939 = *D. ater* Olivier, 1790

Attagenus Latreille, 1807 (**page 226**)

- * *A. (A.) piceus* (Olivier, 1790)
- * *A. (A.) pellio* (L., 1758)
- * *A. (Lanorus) trifasciatus* (F., 1789)

Anthrenus F., 1775

- * *A. (A.) pimpinellae* F., 1775

Lyctidae

Lyctus F., 1793

- * *L. (Xylotrogus) brunneus* Stephens, 1830

Derodontidae

Laricobius Rosenhauer, 1846

- * *L. erichsonius* Rosenhauer, 1846

Byrrhidae

Pelochares Mulsant & Rey, 1869

- * *P. versicolor* (Waltl, 1838)

Limnichus Latreille, 1825

- * *L. aurosericeus* Jacquelin Duval, 1857

Simplocaria Stephens, 1830 (**page 227**)

- * *S. semistriata* (F., 1794)

Lamprobyrrhulus Ganglbauer, 1904

- * *L. nitidus* (Schaller, 1789)

Cytilus Erichson, 1848

- * *C. sericeus* (Förster, 1771)

Byrrhus L., 1767

- * *B. (B.) numidicus* Normand, 1935
- * *B. (B.) fasciatus* Förster, 1771
- * *B. (B.) pustulatus* Förster, 1771
- * *B. (B.) pilula* (L., 1758)
- * *B. (B.) arietinus* Steffahn, 1843
- * *B. (Seminolus) ornatus* Panzer, 1794
- * *B. (Pseudobyrrhus) nigrosparus* Chevrolat, 1866

Syncalypta Stephens, 1830

- * *S. striatopunctata* Steff., 1843

Dryopidae

Dryops Olivier, 1791

- * *D. gracilis* (Karsch, 1881)
- * *D. subincanus* Kuwert, 1890
- * *D. lutulentus* Erichson, 1847

- * *D. luridus* Erichson, 1847
- * *D. intermedius* Kuwert, 1890
- * *D. algericus* Lucas, 1849
- * *D. auriculatus* (Geoffroy, 1785)
- * *D. ernesti* Des Gozis, 1886
- * *D. nitidulus* Heer, 1841

Pomatinus Sturm, 1853 = *Helichus* (**page 228**)

- * *P. substriatus* (Ph. Müller, 1821)

Elmidae

Stenelmis L. Dufour, 1835

- * *S. canaliculata* (Gyllenhal, 1808)

Dupophilus Mulsant & Rey, 1872

- * *D. brevis* Mulsant & Rey, 1872

Elmis Latreille, 1798

- * *E. maugetii* Latreille, 1798
- * *E. aenea* (Ph. Müller, 1806)

Esolus Mulsant & Rey, 1872 (**page 229**)

- * *E. angustatus* (Ph. Müller, 1821)
- * *E. parallelipipedus* (Ph. Müller, 1806)
- * *E. pygmaeus* (Ph. Müller, 1821)

Oulimnius Des Gozis, 1886

- * *O. tuberculatus* (Ph. Müller, 1806)
- * *O. troglodytes* (Gyllenhal, 1827)
- * *O. major* (Rey, 1889)

Limnius Illiger, 1802

- * *L. perrisi* (Léon Dufour, 1843)
- * *L. opacus* Ph. Müller, 1806
- * *L. volckmari* (Panzer, 1793)
- * *L. intermedius* Kuwert, 1890
- * *L. muelleri* (Erichson, 1847)

Macronychus Ph. Müller, 1806

- * *M. quadrituberculatus* Ph. Müller, 1806

Riolus Mulsant & Rey, 1872

- * *R. subviolaceus* (Ph. Müller, 1817)

Mycetophagidae

Litargus Erichson, 1846

- * *L. connexus* (Geoffroy, 1785)

Mycetophagus Hellwig, 1792

- * *M. atomarius* (F., 1792)

Typhaea Curtis, 1830

- * *T. stercorea* (L., 1758)

Berginus Erichson, 1846

* *B. tamarisci* Wollaston, 1854

Colydiidae

Colydium F., 1792

C. filiforme F., 1792

Aglenus Erichson, 1845

* *A. brunneus* (Gyllenhal, 1813)

Coxelus Latreille, 1829

* *C. pictus* (Sturm, 1807)

Colobicus Latreille, 1807

* *C. marginatus* Latreille, 1807

Bitoma Herbst, 1793

* *B. crenata* (F., 1775)

Langelandia Aubé, 1842

* *L. anophtalama* Aubé, 1842

Ogmoderes Ganglbauer, 1899 (**page 231**)

* *O. angusticollis* (Charles Brisout, 1861)

Cerylon Latreille, 1804

* *C. histeroides* (F., 1792)

* *C. fagi* Charles Brisout, 1867

* *C. ferrugineum* Stephens, 1830

Anommatidae

Anommatus Wesmael, 1836

* *A. duodecimstriatus* (Müller, 1821)

Byturidae

Byturus Latreille, 1796

* *B. aestivus* (L., 1758)

* *B. tomentosus* (F., 1775)

Ciidae

Cis Latreille, 1807

* *C. nitidus* (F., 1792)

* *C. micans* (F., 1792)

* *C. quadridens* Mellié, 1848

* *C. lucasi* Abeille, 1874

* *C. bidentulus* (Rosenh., 1847)

Ostomatidae

Temnochila Westwood, 1835

* *T. caerulea* (Olivier, 1790)

Tenebroides Pillier, 1783 (**page 232**)
 * *T. mauritanicus* (L., 1758)

Thymalus Latreille, 1802
 * *T. limbatus* (F., 1787)

Bostrichidae (= ABostrychidae@)

Stephanopachys Waterhouse, 1888
 * *S. quadricollis* (Marseul, 1878)

Bostrychus Müller, 1764
 * *B. capucinus* (L., 1758)

Xylonites Lesne, 1901
 * *X. retusus* (Olivier, 1790)
 * *X. praeustus* (Germar, 1817)

Scobicia Lesne, 1901
 * *S. pustulata* (F., 1801)

Sinoxylon Duftschmid, 1825
 * *S. sexdentatum* (Olivier, 1790)
 * *S. perforans* (Schrank, 1789)

Monotomidae

Monotoma Herbst, 1793
 * *M. (M.) picipes* Herbst, 1793
 * *M. (M.) longicollis* Gyllenhal, 1827

Phalacridae

Phalacrus Paykull, 1800 (**page 233**)
 * *P. fimetarius* (F., 1775)

Olibrus Erichson, 1845
 * *O. affinis* (Sturm, 1807)
 [*O. bicolor* (F., 1792)]
 * *O. bimaculatus* Küster, 1848
 * *O. pygmaeus* (Sturm, 1807)
 * *O. corticalis* Panzer, 1792

Stilbus Seidlitz, 1872
 * *S. testaceus* (Panzer, 1798)

Nitidulidae

Heterhelus Jacquelin Duval, 1859
 * *H. solani* (Heer, 1841)

Brachypterus Kugelann, 1794
 * *B. urticae* (F., 1792)

Brachypterolus Grouvelle, 1912
 * *B. pulicarius* (L., 1758)

Pria Stephens, 1830

- * *P. dulcamarae* (Scopoli, 1763)
- [*P. pallidula* Erichson, 1843]

Meligethes Stephens, 1830

- [*M. (Acanthogethes) solidus* (Illiger, 1798)]
- * *M. (A.) fuscus* (Olivier, 1790)
- * *M. (A.) solidus* Illiger, 1798
- * *M. (M.) subrugosus* (Gyllenhal, 1808)
- * *M. (M.) fulvipes* Charles Brisout, 1863
- * *M. (M.) aeneus* (F., 1775)
- * *M. (M.) umbrosus* Sturm, 1845
- * *M. (M.) maurus* Sturm, 1845
- * *M. (M.) nigrescens* Stephens, 1830
- * *M. (M.) flavipes* Sturm, 1845
- * *M. (M.) villosus* Charles Brisout, 1863
- * *M. (M.) rotundicollis* Charles Brisout, 1863
- * *M. (M.) obscurus* Erichson, 1845
- * *M. (M.) erythropus* (Gyllenhal, 1808)
- * *M. brevis* Sturm, 1845

Carpophilus Stephens, 1830 (**page 234**)

- * *C. (C.) hemipterus* (L., 1758)
- * *C. (Myothorax) dimidiatus* (F., 1792)
- * *C. bipustulatus* (Heer, 1841)

Nitidula F., 1775

- [*N. bipunctata* (L., 1758)]
- * *N. rufipes* (L., 1767)
- * *N. flavomaculata* Rossi, 1790
- * *N. carnaria* (Schaller, 1843)

Omosita Erichson, 1843

- * *O. (Saprobia) colon* (L., 1758)

Epuraea Erichson, 1843 (**page 235**)

- * *E. (Dadopora) guttata* (Olivier, 1811)
- * *E. (E.) depressa* (Illiger, 1798)
- [*E. (E.) melina* Erichson, 1843]
- * *E. (E.) pusilla* (Illiger, 1798)
- * *E. melanocephala* (Marsham, 1802)
- * *E. unicolor* (Olivier, 1790)
- * *E. fuscicollis* (Stephens, 1832)

Soronia Erichson, 1843

- * *S. oblonga* Charles Brisout, 1865

Cychramus Kugelann, 1794

- * *C. luteus* (F., 1787)

Thalycra Erichson, 1843

- * *T. fervida* (Olivier, 1790)

Glischrochilus Reitter, 1873

- * *G. quadripunctatus* (L., 1758)

Pityophagus Schuckard, 1839

- * *P. ferrugineus* (L., 1761)

Rhizophagidae

Rhizophagus Herbst, 1793

- * *R. (R.) ferrugineus* Paykull, 1800
- * *R. (R.) perforatus* Erichson, 1845
- * *R. (R.) picipes* (Olivier, 1790)
- * *R. (R.) nitidulus* (F., 1798)
- * *R. (R.) dispar* Paykull, 1800
- * *R. (R.) bipustulatus* (F., 1792)
- * *R. grandis* Gyllenhal, 1827

Corylophidae

Arthrolips Wollaston, 1854 (**page 236**)

- * *A. regularis* Reitter, 1878
- * *A. humilis* (Rosenh., 1856)

Anisomeristes Matthews, 1890

- * *A. revelieri* (Reitter, 1878)

Sericoderus Stephens, 1829

- * *S. lateralis* (Gyllenhal, 1827)

Peltinus Mulsant & Rey, 1861

- * *P. velatus* Mulsant & Rey, 1861

Cucujidae

Orizaepphilus Ganglbauer, 1899

- * *O. surinamensis* (L., 1758)

Psammoecus Latreille, 1829

- * *P. bipunctatus* (F., 1792)

Uleiota Latreille, 1796

- * *U. planata* (L., 1761)

Laemophlaeus Laporte de Castelnau, 1840

- * *L. (L.) monilis* (F., 1787)
- * *L. (L.) testaceus* (F., 1787)

Prostomis Latreille, 1825

- * *P. mandibularis* (F., 801)

Silvanidae

Ahasverus Des Gozis, 1881 (**page 237**)

- * *A. advena* (Waltl, 1832)

Silvanus Latreille, 1807

- * *S. (S.) unidentatus* (F., 1792)

Erotylidae

Tritoma F., 1775

- * *T. bipustulata* F., 1775

Triplax Herbst, 1793

- * *T. (T.) russica* (L., 1758)
- * *T. (T.) melanocephala* (Latreille, 1804)

Dacnidae

Cryptophilus Reitter, 1874 (**page 237**)

- * *C. integer* (Heer, 1838)

Cryptophagidae

Paramecosoma Curtis, 1833

- [*P. melanocephalum* (Herbst, 1793)]

Micrambe Thomson, 1863

- [*M. vini* (Panzer, 1763)]
- * *M. perrisi* (Charles Brisout, 1882)

Cryptophagus Herbst, 1792

- * *C. (C.) acutangulus* Gyllenhal, 1828
- * *C. (C.) parallelus* Charles Brisout, 1863
- * *C. (C.) badius* Sturm, 1845
- * *C. (C.) pseudodentatus* Bruce, 1934
- * *C. (C.) scanicus* (L., 1758)
- * *C. (C.) immixtus* Rey, 1889
- * *C. (C.) subdepressus* Gyllenhal, 1828
- * *C. (C.) lycoperdi* (Scopoli, 1763)
- * *C. (C.) pilosus* Gyllenhal, 1828
- * *C. (C.) setulosus* Sturm, 1845
- * *C. (C.) cellaris* (Scopoli, 1763)
- * *C. (C.) affinis* Sturm, 1845

Antherophagus Latreille, 1829 (**page 238**)

- [*A. nigricornis* (F., 1787)]
- [*A. pallens* (F., 1781)]

Atomaria Stephens, 1830

- * *A. (Anchicera) scutellaris* Motschoulsky, 1843
- * *A. (Anchicera) gravidula* Erichson, 1846
- * *A. (Anchicera) unifasciata* Erichson, 1846
- * *A. (Anchicera) nigripennis* (Kugelann, 1792)
- * *A. (Anchicera) ruficornis* (Marsham, 1802)

Ephistemus Stephens, 1829 (**page 239**)

- * *E. globulus* (Paykull, 1798)
- * *E. exiguus* Erichson, 1846

Latridiidae (= ALathridiidae@)

Stephostethus LeConte, 1878

- * *S. lardarius* (DeGeer, 1775)

- * *S. productus* Rosenhauer, 1856

Latridius Herbst, 1793

- * *L. minutus* (L., 1767)

Aridius Motschoulsky, 1866

- * *A. nodifer* (Westwood, 1839)

Enicmus Thomson, 1863

- * *E. transversus* (Olivier, 1790)

Dienerella Reitter, 1911

- * *D. elongata* (Curtis, 1830)
- * *D. fili formis* (Gyllenhal, 1827)
- * *D. elegans* (Aubé, 1850)
- * *D. clathrata* (Mannerheim, 1844)

Adistemia Fall, 1899 (**page 240**)

- * *A. watsoni* (Wollaston, 1871)

Corticaria Marsham, 1802

- * *C. pubescens* (Gyllenhal, 1827)
- * *C. crenulata* (Gyllenhal, 1827)
- * *C. fulva* (Comolli, 1837)
- * *C. elongata* (Gyllenhal, 1827)
- * *C. longicornis* (Herbst, 1793)

Corticarina Reitter, 1880

- [*C. fuscula* (Gyllenhal, 1827)]
- * *C. truncatella* (Mannh., 1844)
- * *C. fulvipes* (Comolli, 1837)

Melanophthalma Motschoulsky, 1860

- * *M. (M.) transversalis* (Gyllenhal, 1827)
- * *M. (M.) distinguenda* (Comolli, 1837)
- * *M. (Cortilena) fuscipennis* (Mannerheim, 1844)

Heteroceridae

Heterocerus Latreille, 1792 (**page 240**)

- * *H. (H.) fossor* Kiesenwetter, 1843
- * *H. (H.) marginatus* (F., 1787)
- * *H. (Taenheterocerus) holosericeus* Rosenh., 1856
- * *H. (T.) fenestratus* (Thunberg, 1784)
- * *H. (T.) aragonicus* Kiesenwetter, 1850
- * *H. (Litorimus) pruinosis* Kiesenwetter, 1851

Coccinellidae

Scymninae

Nephus Mulsant, 1846 (**page 242**)

- * *N. quadrimaculatus* (Herbst, 1784)

Pullus Mulsant, 1846

- * *P. auritus* (Thunberg, 1795)

- * *P. impexus* Mulsant & Rey, 1851
- * *P. subvillosus* (Goeze, 1777)
- * *P. haemorrhoidalis* (Herbst, 1797)

Scymnus Kugelann, 1794

- * *S. interruptus* (Goeze, 1777)
- * *S. rufipes* (F., 1798)
- * *S. frontalis* (F., 1787)
- * *S. apetzi* Mulsant, 1846
- * *S. rubromaculatus* (Goeze, 1777)

Hyperaspidinae

Hyperaspis Chevrolat, 1837

- * *H. marginella* (F., 1801)

Chilocorinae

Platynaspis Redtenbacher, 1843

- * *P. luteorubra* (Goeze, 1777)

Chilocorus Leach, 1815

- * *C. bipustulatus* (L., 1758)

Exochomus Redtenbacher, 1843

- * *E. quadripustulatus* (L., 1758)
- * *E. nigromaculatus* (Goeze, 1777)

Coccidulinae

Coccidula Kugellann, 1798

- * *C. rufa* (Herbst, 1783)

Rhyzobius Stephens, 1829

- * *R. lophantae* (Blaisd., 1892)
- * *R. litura* (F., 1787)
- * *R. chrysomeloides* (Herbst, 1792)

Coccinellinae

Tytthaspis Crotch, 1874

- * *T. sedecimpunctata* (L., 1761)

Adalia Mulsant, 1850

- * *A. (A.) bipunctata* (L., 1758)
- * *A. (A.) decempunctata* (L., 1758)

Anatis Mulsant, 1850

- * *A. ocellata* (L., 1758)

Anisosticta Dejean, 1835

- * *A. novemdecimpunctata* (L., 1758)

Aphidecta Weise, 1899

- * *A. oblitterata* (L., 1758)

Calvia Mulsant, 1850

- * *C. (Anisocalvia) quatuordecimguttata* (L., 1758)

Coccinella L., 1758

* *C. septempunctata* L., 1758

* *C. hieroglyphica* L., 1758

Coccinula Dobzhansky, 1925

* *C. quatuordecimpustulata* (L., 1758)

Harmonia Mulsant, 1850

* *H. quadripunctata* (Pontoppidan, 1763)

Hippodamia Dejean, 1835

* *H. (Adonia) variegata* (Goeze, 1777)

* *H. (Semiadalia) undecimnotata* (Schneider, 1792)

Oenopia Mulsant, 1850 (**page 244**)

* *O. lyncea* (Olivier, 1808)

* *O. conglobata* (L., 1758)

Propylea Mulsant, 1850

* *P. quatuordecimpunctata* (L., 1758)

Sospita Mulsant, 1850 (**page 243**)

* *S. (S.) vigintiguttata* (L., 1758)

* *S. (Myzia) oblongoguttata* (L., 1758)

Psylloborinae

Halysia Mulsant, 1846

* *H. sedecimguttata* (L., 1758)

Psyllobora Chevrolat, 1837

* *P. vigintiduopunctata* (L., 1758)

Vibidia Mulsant, 1846

* *V. duodecimguttata* (Poda, 1761)

Epilachninae

Epilachna Chevrolat, 1837 (**page 241**)

* *E. argus* (Geoffroy, 1762)

Subcoccinella Hüber, 1841

* *S. vigintiquatuorpunctata* (L., 1758)

Endomychidae

Sphaerosoma Leach, 1819

* *S. globosum* (Sturm, 1807)

* *S. pilosum* (Panzer, 1792)

* *S. piliferum* Müller, 1821

Lycoperdina Latreille, 1807

* *L. (L.) bovistae* (F., 1792)

Mycetina Mulsant, 1846

* *M. cruciata* (Schaller, 1783)

Endomychus Panzer, 1795

- * *E. coccineus* (L., 1758)

PHYTOPHAGOIDEA

Chrysomelidae

Donaciinae

Donacia F., 1775

- * *D. (D.) simplex* F., 1775
- * *D. (D.) bicolor* Zschach, 1788
- * *D. (D.) obscura* Gyllenhal, 1813
- * *D. (D.) thalassina* Germar, 1811
- [*D. (D.) antiqua* Kunze, 1818]

Plateumaris Thomson, 1866

- * *P. (Euplateumaris) sericea* (L., 1761)
- * *P. (E.) discolor* (Panzer, 1795)
- * *P. (P.) braccata* (Scopoli, 1772)
- * *P. (P.) consimilis* (Schränk, 1781)
- * *P. (P.) affinis* (Kunze, 1818)

Criocerinae

Oulema Des Gozis, 1886

- * *O. tristis* (Herbst, 1786)
- * *O. gallaeciana* (Heyden, 1870) = *lichenis*
- * *O. melanopus* (L., 1758)
- * *O. hoffmannseggii* Lacordaire, 1845

Lema F., 1798

- * *L. cyanella* (L., 1758)

Crioceris Geoffroy, 1762 *apud* Müller, 1764

- * *C. asparagi* (L., 1758)
- * *C. paracenthesis* (L., 1767)
- * *C. duodecimpunctata* (L., 1758)

Lilioceris Reitter, 1912

- * *L. merdigera* (L., 1758)
- * *L. lili* (Scopoli, 1763)

Clytrinae

Clytra Laicharting, 1781

- * *C. (C.) quadripunctata* (L., 1758)
- * *C. (C.) laeviuscula* Ratzeburg, 1837
- [*C. (Clytraria) atraphaxidis* (Pallas, 1773)]

Lachnaia Chevrolat, 1837

- * *L. tristigma* Lacordaire, 1846
- * *L. cylindrica* Lacordaire, 1848
- * *L. sexpunctata* (Scopoli, 1763)
- * *L. pubescens* (Dufour, 1820)

Labidostomis Germar, 1817

- * *L. Iusitanica* (Germar, 1823) var. *meridionalis* Lacordaire
- * *L. humeralis* (Schneider, 1792)
- * *L. lucida* Germar, 1823
- * *L. pallidipennis* Gebler, 1830
- * *L. longimana* (L., 1761)
- * *L. tridentata* (L., 1758)
- L. taxicornis* (F., 1792) sur chêne

Smaragdina Chevrolat, 1837

- * *S. concolor* (F., 1793)
- * *S. aurita* (L., 1766)
- * *S. salicina* (Scopoli, 1763)

Chilotomina Reitter, 1912

- * *C. nigratarsis* (Lacordaire, 1848)

Coptocephala Chevrolat, 1837

- * *C. unifasciata* (Scopoli, 1763)
- * *C. quadrimaculata* (L., 1767)
- * *C. tetradya* (Küster, 1844)

Tituboea Lacordaire, 1848

- * *T. biguttata* (Olivier, 1791)

Cryptocephalinae*Cryptocephalus* Geoffroy, 1762 *apud* Müller, 1764

- * *C. (Protophysus) schaefferi* Schrank, 1789
- * *C. (Cryptodontus) loreyi* Solier, 1836
- * *C. (C.) coryli* (L., 1758)
- * *C. (C.) quadripunctatus* Olivier, 1808
- * *C. (Cryptocephalus) primarius* Harold, 1872
- * *C. (C.) primarius* Harold, 1872
- * *C. (C.) pexicollis* Suffrian, 1847
- * *C. (C.) bimaculatus* F., 1781
- * *C. (C.) rugicollis* Olivier, 1791
- * *C. (C.) aureolus* Suffrian, 1847
- * *C. (C.) sericeus* (L., 1758)
- * *C. (C.) globicollis* Suffrian, 1847
- * *C. (C.) hypochoeridis* (L., 1758) *therondi* Franz, 1949
- * *C. (C.) violaceus* Laicharting, 1781
- * *C. (C.) tibialis* Charles Brisout, 1866
- * *C. (C.) tetraspilus* Suffrian, 1851
- * *C. (C.) marginellus* Olivier, 1791
- * *C. (C.) nitidus* (L., 1758)
- * *C. (C.) sexmaculatus* Olivier, 1791
- * *C. (C.) imperialis* Laicharting, 1781
- * *C. (C.) trimaculatus* Rossi, 1790
- * *C. (C.) variegatus* F., 1781
- * *C. (C.) carinthiacus* Suffrian, 1848
- * *C. (C.) labiatus* (L., 1761)
- * *C. (C.) bipunctatus* (L., 1758)
- * *C. (C.) biguttatus* (Scopoli, 1763)
- * *C. (C.) octomaculatus* Rossi, 1790
- * *C. (C.) sulfureus* Olivier, 1808

- * *C. (C.) parvulus* Mue]ler, 1776
- * *C. (C.) pelleti* Marseul, 1875
- * *C. (C.) concinnus* Suffrian, 1847
- * *C. (C.) marginatus* F., 1781
- * *C. (C.) octacosmus* Bedel, 1891
- * *C. (C.) decemmaculatus* (L., 1758)
- * *C. (C.) moraei* (L., 1758)
- * *C. (C.) crassus* Olivier, 1791
- * *C. (C.) sexpustulatus* Villers, 1789
- * *C. (C.) flavipes* F., 1781
- * *C. (C.) vittatus* F., 1775
- * *C. (C.) pominorum* Burlini, 1955
- * *C. (Disopus) pini* (L., 1758)
- * *C. (Burlinius) bilineatus* (L., 1767)
- * *C. (B.) elegantulus* Gravenhorst, 1807
- * *C. (B.) chrysopus* Gmelin, 1788
- * *C. (B.) ocellatus* Drapiez, 1819
- * *C. (B.) labiatus* (L., 1761)
- * *C. (B.) pygmaeus* F., 1792
- * *C. (B.) fulvus* Goeze, 1777
- * *C. (B.) ochroleucus* Stephens, 1834
- * *C. (B.) pusillus* F., 1777
- * *C. (B.) rufipes* Goeze, 1777

Pachybrachis Chevrolat, 1837

- [*P. (P.) pradensis* Marseul, 1875]
- * *P. (P.) pallidulus* Suffrian, 1851 subsp. *suturalis* Weise, 1882
- (*P. tessellatus* (Olivier, 1791)
- * *P. (P.) picus* Weise, 1882
- * *P. (P.) sinuatus* Mulsant & Rey, 1859
- * *P. (P.) hippophaes* Suffrian, 1848
- * *P. (P.) fimbriolatus* Suffrian, 1848
- P. (P.) scriptus* Herrich-Schaeffer, 1838 sur thym
- P. (P.) catalonicus fallaciosus* Burlini, 1964 sur Salix
- * *P. (Chloropachys) azureus* Suffrian, 1848.

Stylosomus Suffrian, 1848

- * *S. rugithorax* Abeille, 1877
- S. ilicicola* Suffrian, 1848 sur chêne vert
- S. lutetianus* Sainte-Claire-Deville, 1910 sur bouleau

Eumolpinae

Eumolpus Illiger, 1798

- * *E. asclepiadeus* (Pallas, 1776)

Bromius Chevrolat, 1837

- * *B. obscurus* (L., 1758)

Timarchinae

Timarcha Latreille, 1829

- * *T. (T.) tenebricosa* (F., 1775)
- * *T. (T.) goettingensis* (L., 1758)
- * *T. (T.) goettingensis* subsp. *bruleriei* Bellier, 1870
- * *T. (T.) goettingensis* subsp. *sinuaticollis* Fairmaire, 1861

Chrysomelinae*Leptinotarsa* Stål, 1858

- * *L. decemlineata* (Say, 1824)

Chrysolina Motschoulsky, 1860

- C. (Melasomoptera) lucida* (Olivier, 1807) sur *Calamintha nepeta*
- * *C. (Fastuolina) fastuosa* (Scopoli, 1763)
- * *C. (Chrysomorpha) cerealis* (L., 1767)
- * *C. (Menthastriella) herhacea* (Duftschmid, 1825)
- * *C. (Maenadochrysa) femoralis* (Olivier, 1790)
- * *C. (Taeniochrysea) americana* (L., 1758)
- * *C. (C.) staphylaea* (L., 1758)
- * *C. (Stichoptera) sanguinolenta* (L., 1758)
- * *C. (S.) latecincta* (Demaison, 1896)
- * *C. (S.) kuesteri* (Helliesen, 1911)
- * *C. (S.) gypsophilae* (Kuester, 1845)
- * *C. (Craspeda) limbata* (F., 1775)
- * *C. (Chalcoidea) marginata* (L., 1758)
- * *C. (C.) carnifex* subsp. *melanaria* (Suffrian, 1851) = *coerulescens*
- * *C. (C.) fuliginosa* (Olivier, 1807)
- [*C. (C.) interstincta* (Suffrian, 1851)]
- * *C. (Minckia) oricalcia* (Muller, 1776)
- * *C. (Hypericia) varians* (Schaller, 1783)
- * *C. (H.) hyperici* (Forster, 1771)
- * *C. (H.) brunsvicensis* (Gravenhorst, 1807)
- * *C. (H.) geminata* Paykull, 1799
- * *C. (H.) quadrigemina* (Suffrian, 1851) = *cuprina*
- * *C. (Ovosoma) haemoptera* (L., 1758)
- * *C. (Erythrochrysa) polita* (L., 1758)
- * *C. (Threnosoma) joliveti* Bechyné, 1950
- * *C. (Allochrysolina) fuliginosa* (Olivier, 1807)

Oreina Chevrolat, 1837

- * *O. (Allorina) coerulea* (Olivier, 1790) = *collucens* = *colluceus* !
- * *O. (Chrysochloa) cacaliae* (Schrank, 1785)
- * *O. (C.) speciosissima* (Scopoli, 1763)
- * *O. (O.) viridis* (Duftschmid, 1825)
- * *O. (O.) speciosa* (L., 1758) = *gloriosa*

Colaspidema Laporte, 1833

- * *C. atrum* (Olivier, 1790)

Gastrophysa Chevrolat, 1837

- * *G. polygoni* (L., 1758)

Phaedon Latreille, 1829

- * *P. (P.) laevigatus* (Duftschmid, 1825)
- * *P. (P.) cochleariae* (F., 1792)
- * *P. (Paraphaedon) tumidulus* (Germar, 1824)

Neophaedon Jacobson, 1901

- * *N. pyritosus* (Rossi, 1792)

Hydrothassa Thomson, 1866

- * *H. (Agrostithassa) glabra* (Herbst, 1783) var. *aucta* (F., 1787)
H. (H.) hannoveriana (F., 1775) subsp. *germanica* Weise, 1884 (3 ex, AArdèche@, Puel : coll. Lécureu)
- * *H. (H.) marginella* (L., 1758)

Prasocuris Latreille, 1802

- * *P. phellandrii* (L., 1758)

Plagiodera Chevrolat, 1837

- * *P. versicolora* (Laicharting, 1781)

Chrysomela L., 1758

- * *C. (C.) populi* L., 1758
- * *C. (C.) tremulae* F., 1787
- * *C. (Macrolina) vigintipunctata* (Scopoli, 1763)
- [*C. (M.) lapponica* L., 1758]

Linnaeidea Motschoulsky, 1860

- * *L. aenea* (L., 1758)

Phratora Chevrolat, 1837

- * *P. (P.) tibialis* (Suffrian, 1851)
- * *P. (P.) laticollis* (Suffrian, 1851)
- * *P. (P.) vitellinae* (L., 1758)
- P. (Chaetoceroides) vulgatissima* (L., 1758)

Gonioctena Chevrolat, 1837

- * *G. (G.) viminalis* (L., 1758)
- * *G. (G.) linnaeana* (Schränk, 1781)
- * *G. (Goniomena) quinquepunctata* (F., 1787)
- * *G. (G.) pallida* (L., 1758)
- * *G. (Spartophila) variabilis* (Olivier, 1790)
- * *G. (S.) olivacea* (Förster, 1771)

Cyrtonus Latreille, 1829

- * *C. dufouri* Dufour, 1847

Galerucinae

Galerucella Crotch, 1873

- * *G. (Neogalerucella) lineola* (F., 1781)

Xanthogaleruca Laboissière, 1934

- * *X. luteola* (Müller, 1766)

Pyrrhalta Joannis, 1866

- * *P. viburni* (Paykull, 1799)

Lochmaea Weise, 1883

- * *L. caprea* (L., 1758)
- * *L. suturalis* (Thomson, 1866)
- * *L. crataegi* (Förster, 1771)

Arima Chapuis, 1875

- * *A. marginata* (F., 1781)

Galeruca Geoffroy, 1762 *apud* Müller, 1764

- * *G. (G.) tanacetii* (L., 1758)
- * *G. (G.) pomonae* (Scopoli, 1763)
- * *G. (G.) interrupta* Illiger, 1802
- * *G. (G.) laticollis* Sahlberg, 1837
- * *G. (Emarhopa) rufa* Germar, 1824

Sermylassa Reitter, 1912

- * *S. halensis* (L., 1767)

Agelastica Chevrolat, 1837

- * *A. alni* (L., 1758)

Exosoma Jacoby, 1903

- * *E. Iusitanicum* (L., 1767)

Calomicrus Stephens, 1831

- * *C. circumfusus* (Marsham, 1802)

Monolepta Chevrolat, 1837

- * *M. erythrocephala* (Olivier, 1801)

Luperus Geoffroy, 1762 *apud* Müller, 1764

- * *L. longicornis* (F., 1781)
- * *L. luperus* (Sulzer, 1776)
- * *L. flavipes* (L., 1767)
- * *L. pyreneus* (Germar, 1824)

Alticinae

Phyllotreta Chevrolat, 1837

- * *P. nemorum* (L., 1758)
- * *P. parallelata* (Boieldieu, 1859)
- * *P. undulata* Kutschera, 1860
- [*P. striolata* (F., 1803) = *vittata*]
- * *P. exclamationis* (Thunberg, 1784)
- * *P. atra* (F., 1775)
- * *P. cruciferae* (Goeze, 1777)
- * *P. diademata* Foudras, 1860
- * *P. nigripes* (F., 1775)
- * *P. nodicornis* (Marsham, 1802)

Aphthona Chevrolat, 1837

- * *A. cyparissiae* (Koch, 1803)
- * *A. illigeri* Bedel, 1898
- * *A. pygmaea* Kutschera, 1861
- * *A. cyanella* (Redtenbacher, 1849)
- * *A. venustula* Kutschera, 1861
- * *A. euphorbiae* (Schränk, 1781)
- * *A. violacea* (Koch, 1803)
- * *A. herbigrada* (Curtis, 1837)

Longitarsus Berthold, 1827

- * *L. pellucidus* (Foudras, 1860)
- * *L. ochroleucus* (Marsham, 1802)
- * *L. succineus* (Foudras, 1860)
- * *L. tabidus* (F., 1775)

- * *L. foudrasi* Weise, 1893
- * *L. nigrofasciatus* (Goeze, 1777)
- [*L. ferrugineus* (Foudras, 1860)]
- * *L. melanocephalus* (DeGeer, 1775)
- * *L. curtus* (Allard, 1860)
- * *L. exoletus* (L., 1758)
- * *L. pratensis* (Panzer, 1794)
- * *L. ballotae* (Marsham, 1802)
- * *L. atricillus* (L., 1761)
- * *L. quadriguttatus* (Pontoppidan, 1765)
- [*L. holsaticus* (L., 1758)]
- * *L. luridus* (Scopoli, 1763)
- * *L. ventricosus* (Foudras, 1860)
- * *L. niger* (Koch, 1803)
- * *L. oblitteratus* (Rosenhauer, 1847)
- * *L. echii* (Koch, 1803)
- * *L. oblitteratoides* Gruev, 1973

Hermaphysa Foudras, 1860

- * *H. cicatrix* (Illiger, 1807)

Altica Geoffroy, 1762

- * *A. Iythri* Aubé, 1843
- * *A. ampelophaga* (Guérin*Méneville, 1858)
- * *A. brevicollis* Foudras, 1860
- * *A. oleracea* (L., 1758)
- * *A. carduorum* (Guérin*Méneville, 1858)
- * *A. pusilla* Duftschmid, 1825

Arrhenocoela Foudras, 1860

- * *A. lineata* (Rossi, 1790)

Asiorestia Jacobson, 1925

- * *A. transversa* (Marsham, 1802)
- * *A. ferruginea* (Scopoli, 1763)
- [*A. femorata* (Gyllenhal, 1813)]
- * *A. motschulskii* Konstantinov, 1991 = *sublaevis*

Crepidodera Chevrolat, 1837

- * *C. aurea* (Fourcroy, 1785)
- * *C. aureola* (Foudras, 1860)
- * *C. aurata* (Marsham, 1802)
- * *C. plutus* (Latreille, 1804)

Epitrix Foudras, 1860

- * *E. pubescens* (Koch, 1803)

Minota Kutschera, 1859

- * *M. impuncticollis* (Allard, 1860) = *obesa*

Podagrica Chevrolat, 1837

- * *P. fuscicornis* (L., 1766)
- * *P. fuscipes* (F., 1775)
- * *P. malvae* (Illiger, 1807)

Mantura Stephens, 1831

- * *M. chrysanthemi* (Koch, 1803)

* *M. rustica* (L., 1766)

Chaetocnema Stephens, 1831

- * *C. (Tlanoma) semicoerulea* (Koch, 1803)
- * *C. (T.) concinna* (Marsham, 1802)
- * *C. (T.) tibialis* (Illiger, 1807)
- * *C. (T.) depressa* (Boieldieu, 1859)
- * *C. (C.) aridula* (Gyllenhal, 1827)
- [*C. (C.) confusa* (Boheman, 1851)]
- * *C. (C.) mannerheimi* (Gyllenhal, 1827)
- * *C. (C.) arida* Foudras, 1860
- * *C. (C.) hortensis* (Fourcroy, 1785)
- [*C. (C.) subcoerulea* (Kutschera, 1862)]

Dibolia Latreille, 1829

- * *D. depressiuscula* Letzner, 1846
- * *D. timida* (Illiger, 1807)
- [*D. cryptocephala* (Koch, 1803)]

Sphaeroderma Stephens, 1831

- * *S. testaceum* (F., 1775)
- * *S. rubidum* (Graëlls, 1858)

Apteropeda Chevrolat, 1837

- * *A. orbiculata* (Marsham, 1802)

Mniophila Stephens, 1831

- * *M. muscorum* (Koch, 1803)

Psylliodes Berthold, 1827

- * *P. affinis* (Paykull, 1799)
- * *P. laevifrons* Kutschera, 1864
- * *P. toelgi* Heikertinger, 1914
- * *P. cuprea* (Koch, 1803)
- * *P. chrysocephala* (L., 1758)
- * *P. isatidis* Heikertinger, 1912
- * *P. napi* (F., 1792)

Hispinae

Hispa L., 1767

- * *H. atra* L., 1767

Dicladispa Gestro, 1897

- * *D. testacea* (L., 1767)

Cassidinae

Cassida L., 1758

- * *C. (Odontionycha) viridis* L., 1758
- * *C. (O.) hemisphaerica* Herbst, 1799
- * *C. (C.) seladonica* Gyllenhal, 1827
- * *C. (C.) rubiginosa* Müller, 1776
- [*C. (C.) stigmatica* Suffrian, 1844]
- * *C. (C.) prasina* Illiger, 1798
- * *C. (C.) sanguinolenta* O.F. Müller, 1776

- * *C. (C.) vibex* L., 1767
- * *C. (C.) pannonica* Suffrian, 1844
- * *C. (C.) denticollis* Suffrian, 1844
- * *C. (C.) inquinata* Brullé, 1832
- * *C. (C.) deflorata* Suffrian, 1844
- * *C. (Mionycha) azurea* F., 1801
- * *C. (M.) margaritacea* Schaller, 1783
- * *C. (M.) subreticulata* Suffrian, 1844
- * *C. (M.) flaveola* Thunberg, 1794
- * *C. (Hippocassida) subferruginea* (Schrank, 1776)
- * *C. (H.) meridionalis* (Suffrian, 1844)
- * *C. (Cassidulella) vittata* Villers, 1789

Bruchidae

Spermophagus Schönherr, 1833 (**page 262**)

- * *S. (S.) sericeus* (Geoffroy, 1795)

Bruchus L., 1767 (**page 263**)

- * *B. laticollis* Boheman, 1833
- * *B. loti* Paykull, 1800
- * *B. tristiculus* Fåhræus, 1839
- * *B. rufimanus* Boheman, 1833
- * *B. affinis* Fröl., 1799
- * *B. pisorum* (L., 1758)
- * *B. viciae* Olivier, 1795
- * *B. rufipes* Herbst, 1783
- * *B. luteicornis* Illiger, 1794

Bruchidius Schilsky, 1905

- * *B. marginalis* (F., 1777)
- * *B. unicolor* (Olivier, 1795)
- * *B. biguttatus* (Olivier, 1795)
- * *B. gilvus* (Gyllenhal, 1839)
- * *B. murinus* (Boheman, 1829)
- * *B. pauper* (Boheman, 1829)
- * *B. perparvulus* (Boheman, 1839) = *pygmaeus*
- * *B. sericatus* (Germar, 1824)
- * *B. lividimanus* (Gyllenhal, 1833)
- * *B. fasciatus* (Olivier, 1795) = *villosus*
- * *B. seminarius* (L., 1767)

Urodon Schönherr, 1826

- * *U. suturalis* (F., 1792)

Anthribidae

Platyrhinus Clairville, 1798

- * *P. resinosus* (Scopoli, 1763)

Tropideres Schönherr, 1826 (**page 264**)

- * *T. (T.) albirostris* (Herbst, 1784)
- * *T. (Enebreutes) sepicola* (F., 1792)
- * *T. (E.) curtirostris* Mulsant & Rey, 1860
- * *T. (E.) niveirostris* (F., 1798)

Platystomus Schneider, 1791.

* *P. albinus* (L., 1758)

Anthribus Geoffroy ap. Müller, 1764.

* *A. fasciatus* Förster, 1771

* *A. nebulosus* Förster, 1771

Cerambycidae

Prioninae

Ergates Serville, 1832

* *E. faber* (L., 1767)

Prionus Müller, 1764

* *P. coriarius* (L., 1758)

Aegosoma Serville, 1832

* *A. scabricorne* (Scopoli, 1763)

Lepturinae

Rhagium F., 1775 (**page 265**)

* *R. (R.) inquisitor* (L., 1758)

* *R. (Megarhagium) mordax* (DeGeer, 1775)

* *R. (M.) sycophanta* (Schrank, 1781)

* *R. (Hagrium) bifasciatum* (F., 1775)

Rhamnusium Latreille, 1829.

* *R. bicolor* (Schrank, 1781)

Oxymirus Mulsant, 1863.

* *O. cursor* (L., 1758)

Brachyta Fairmaire, 1864.

* *B. interrogationis* (L., 1758)

Acmaeops Le Conte, 1850

* *A. marginatus* (F., 1781)

Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972 (**page 266**)

* *G. pratensis* (Laicharting, 1784)

Dinoptera Mulsant, 1863

* *D. collaris* (L., 1758)

Carilia Mulsant, 1863

* *C. virginea* (L., 1758)

Cortodera Mulsant, 1863

* *C. femorata* (F., 1787)

Grammoptera Serville, 1835

* *G. ustulata* (Schaller, 1783)

* *G. abdominalis* (Stephens, 1831) = *variegata*

* *G. ruficornis* (F., 1781)

Alosterna Mulsant, 1863

* *A. tabacicolor* (DeGeer, 1775)

Pseudallosterna Plaviltshikov, 1934

* *P. livida* (F., 1776)

Vadonia Mulsant, 1863 (**page 267**)

* *V. unipunctata* (F., 1787)

Anoplodera Mulsant, 1839

* *A. sexguttata* (F., 1775)

* *A. rufipes* (Schaller, 1783)

Stictoleptura Casey, 1924

* *S. scutellata* (F., 1781)

Corymbia Des Gozis, 1886

* *C. rubra* (L., 1758)

* *C. fontenayi* (Mulsant, 1839)

Brachyleptura Casey, 1913

* *B. cordigera* (Fuesslins, 1775)

* *B. trisignata* (Fairmaire, 1852)

* *B. fulva* (DeGeer, 1775)

* *B. hybrida* (Rey, 1885)

* *B. maculicornis* (DeGeer, 1775)

Anastrangalia Casey, 1924 (**page 268**)

* *A. sanguinolenta* (L., 1761)

* *A. dubia* (Scopoli, 1763)

Pachytodes Pic, 1891

* *P. cerambyciformis* (Schrank, 1781)

Leptura L., 1758

* *L. (L.) aurulenta* F., 1792

* *L. (L.) quadrifasciata* L., 1758

* *L. (Rutpela) maculata* Poda, 1761

Stenurella Villiers, 1974

* *S. melanura* (L., 1758)

* *S. bifasciata* (Müller, 1776)

* *S. nigra* (L., 1758)

Pedostrangalia Sokolow, 1896 (**page 269**)

* *P. revestita* (L., 1767)

Strangalia Serville, 1835 (**page 270**)

* *S. attenuata* (L., 1758)

Necydalis L., 1758

* *N. ulmi* Chevrolat, 1838

Spondylinae

Spondylis F., 1775

* *S. buprestoides* (L., 1758)

Aseminae

Asemum Eschscholtz, 1830

* *A. striatum* (L., 1758)

Arhopalus Serville, 1834

* *A. fesus* (Mulsant, 1839) = *tristis*

* *A. rusticus* (L., 1758)

* *A. syriacus* (Reitter, 1895)

Isarthron Dejean, 1835 = *Tetropium*

* *I. castaneum* (L., 1758)

Cerambycinae

Hesperophanes Mulsant, 1839

* *H. (H.) sericeus* (F., 1787)

* *H. (H.) cinereus* (Villers, 1789)

* *H. (H.) pallidus* (Olivier, 1790)

* *H. (Trichoferus) fasciculatus* (Faldermann, 1837)

* *H. (T.) griseus* (F., 1792)

Gracilia Serville, 1834 (**page 271**)

* *G. minuta* (F., 1781)

Nathrius Brèthes, 1916

* *N. brevipennis* (Mulsant, 1839)

Molorchus F., 1792

* *M. minor* (L., 1758)

Glaphyra Newman, 1840

* *G. umbellatarum* (Schreber, 1759)

Stenopterus Illiger, 1804

* *S. rufus* (L., 1767)

Callimellum Strand, 1928

* *C. angulatum* (Schrank, 1789)

* *C. abdominale* (Olivier, 1795)

Cartallum Serville, 1834

* *C. ebulinum* (L., 1767)

Obrium Curtis, 1825

* *O. brunneum* (F., 1792)

* *O. cantharinum* (L., 1767)

Deilus Serville, 1834

* *D. fugax* (Olivier, 1790)

Cerambyx L., 1758

- * *C. cerdo* L., 1758
- * *C. velutinus* Brullé, 1832
- * *C. miles* Bonelli, 1812
- * *C. scopolii* Fuesslins, 1775

Purpuricenus Germar, 1824 (**page 272**)

- * *P. budensis* (Götz, 1783)
- * *P. kaehleri* (L., 1758)
- * *P. globulicollis* Mulsant, 1839

Aromia Serville, 1833 (**page 273**)

- * *A. moschata* (L., 1758)

Rosalia Serville, 1833

- * *R. alpina* (L., 1758)

Hylotrupes Serville, 1834

- * *H. bajulus* (L., 1758)

Semanotus Mulsant, 1839

- * *S. laurasi* (Lucas, 1852)

Ropalopus Mulsant, 1839

- * *R. clavipes* (F., 1775)
- * *R. spinicornis* Abeille, 1869
- * *R. femoratus* (L., 1758)

Callidostola Reitter, 1913 (**page 274**)

- * *C. aenea* (DeGeer, 1775)

Callidium F., 1775

- * *C. violaceum* (L., 1758)

Pyrrhidium Fairmaire, 1864

- * *P. sanguineum* (L., 1758)

Phymatodes Mulsant, 1839

- * *P. testaceus* (L., 1758)

Reitteroderus Sama, 1991 = *Phymatoderus*

- * *R. pusillus* (F., 1787)
- * *R. lividus* (Rossi, 1794)

Phymatodellus Reitter, 1912

- * *P. rufipes* (F., 1776)

Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934

- * *P. fasciatus* (Villers, 1789)

Poecilium Fairmaire, 1864

- * *P. alni* (L., 1767)

Rusticoclytus Vives, 1977

- * *R. rusticus* (L., 1758)

Xylotrechus Chevrolat, 1860 (**page 275**)

* *X. antilope* (Schönherr, 1817)

* *X. arvicola* (Olivier, 1795)

Clytus Laircharting, 1784

* *C. arietis* (L., 1758)

* *C. rhamni* Germar, 1817

* *C. tropicus* (Panzer, 1795)

Pseudosphegistes Reitter, 1912

* *P. cinereus* (Laporte de Castelnau & Gory, 1836)

Plagionotus Mulsant, 1842

* *P. detritus* (L., 1758)

* *P. arcuatus* (L., 1758)

Echinocerus Mulsant, 1863

* *E. floralis* (Pallas, 1773)

Chlorophorus Chevrolat, 1863

* *C. pilosus* (Förster, 1771)

* *C. varius* (O.F. Müller, 1766)

* *C. figuratus* (Scopoli, 1763)

* *C. sartor* (O.F. Müller, 1766)

* *C. ruficornis* (Olivier, 1790)

* *C. trifasciatus* (F., 1781)

Anaglyptus Mulsant, 1839 (**page 276**)

* *A. gibbosus* (F., 1787)

* *A. mysticus* (L., 1758)

Lamiinae

Dorcadion Dalman, 1817

* *D. (Iberodorcadion) fuliginator* (L., 1758) subsp. *monticola* Mulsant, 1853
Jastres (commune de Lavilledieu), avril 2007.

* *D. (I.) molitor* (F., 1775)

Mesosa Latreille, 1829 (**page 277**)

* *M. curculionoides* (L., 1761)

Aphelocnemia Stephens, 1831

* *A. nebulosa* (F., 1781)

Agapanthia Serville, 1835

* *A. cardui* (L., 1767)

* *A. villosoviridescens* (DeGeer, 1775)

* *A. dahli* (Richter, 1821)

* *A. kirbyi* (Gyllenhal, 1817)

* *A. violacea* (F., 1775)

Calamobius Guérin-Méneville, 1849 (**page 278**)

* *C. filum* (Rossi, 1790)

Pterolophia Newman, 1842 (**page 279**)

* *P. M. *grisea* (Mulsant, 1846)

Parmena Latreille, 1829

* *P. balteus* (L., 1767)

Morimus Serville, 1835

* *M. asper* (Sulzer, 1776)

Lamia F., 1775

* *L. textor* (L., 1758)

Monochamus Dejean, 1821

* *M. galloprovincialis* (Olivier, 1795)

Pogonocherus Dejean, 1821

* *P. fasciculatus* (DeGeer, 1775)

* *P. decoratus* Fairmaire, 1855

* *P. ovatus* (Goeze, 1777)

Eupogonocherus Linsley, 1935

* *E. hispidus* (L., 1758)

* *E. hispidulus* (Piller, 1783)

* *E. perroudi* (Mulsant, 1839)

Deroplia (= *Stenidea*) (**page 280**)

* *D. genei* (Aragona, 1830)

Anaesthetis Mulsant, 1839

* *A. testacea* (F., 1781)

Acanthocinus Dejean, 1821

* *A. aedilis* (L., 1758)

* *A. reticulatus* (Razoumowsky, 1789)

* *A. griseus* (F., 1792)

Leiopus Serville, 1835

* *L. nebulosus* (L., 1758)

Exocentrus Dejean, 1837

* *E. adpersus* Mulsant, 1846

* *E. punctipennis* Mulsant & Guillebeau, 1856

Aegomorphus Haldeman, 1847 = *Acanthoderes*

* *A. clavipes* (Schrank, 1781)

Tetrops Stephens, 1831

* *T. praeusta* (L., 1758)

Anaerea Mulsant, 1839 (**page 281**)

* *A. carcharias* (L., 1758)

* *A. similis* (Laicharting, 1784)

Saperda F., 1775

* *S. scalaris* (L., 1758)

* *S. punctata* (L., 1767)

Compsidia Mulsant, 1839 (**page 282**)

* *C. populnea* (L., 1758)

Stenostola Dejean, 1835

* *S. ferrea* (Schrank, 1776)

Musaria Thomson, 1864

* *M. rubropunctata* (Goeze, 1777)

Opsilia Mulsant, 1863

* *O. coerulescens* (Scopoli, 1763)

* *O. uncinata* (Redtenbacher, 1842)

Phytoecia Dejean, 1821

* *P. cylindrica* (L., 1758)

* *P. icterica* (Schaller, 1783)

* *P. pustulata* (Schrank, 1776)

* *P. virgula* (Charpentier, 1825)

* *P. nigricornis* (F., 1781)

Oberea Dejean, 1837

* *O. (O.) oculata* (L., 1758)

* *O. (O.) pupillata* (Gyllenhal, 1817)

* *O. (O.) linearis* (L., 1761)

* *O. (Amaurostoma) erythrocephala* (Schrank, 1776)

Curculionidae

Otiorhynchinae

Otiorhynchus Germar, 1824 (**page 283**)

* *O. (O.) auropunctatus* Gyllenhal, 1834

* *O. (O.) meridionalis* Gyllenhal, 1834

* *O. (O.) fuscipes* (Olivier, 1808)

* *O. (O.) clavipes* (Bonsdorff, 1785)

* *O. (O.) lugdunensis* Boheman, 1843

* *O. (O.) morio* (F., 1781)

* *O. (O.) rugosostriatus* (Goeze, 1777)

* *O. (O.) scaber* (L., 1758)

* *O. (O.) ligneus* (Olivier, 1808)

* *O. (O.) hungaricus* Germar, 1824

* *O. (Dorymerus) varius* Boheman, 1843

* *O. (D.) singularis* (L., 1767)

* *O. (D.) impressiventris* Fairmaire, 1859

* *O. (D.) procerus* Stierlin, 1875

* *O. (D.) sulcatus* (F., 1775)

* *O. (D.) rugifrons* (Gyllenhal, 1813)

[*O. (Tournieria) ovatus* (L., 1758)]

* *O. (Arammichnus) ligustrici* (L., 1758)

Homorythmus Bedel, 1883 (**page 285**)

* *H. hirticornis* (Herbst, 1795)

Peritelus Germar, 1824

* *P. (P.) sphaeroides* Germar, 1824

* *P. (P.) flavipennis* Jacquelin Duval, 1852

* *P. (P.) noxius* Boheman, 1834

- * *P. (P.) necessarius* Gyllenhal, 1834
- [*P. (Meira) vauculianus* Desbrochers des Loges, 1898]
- * *P. (Meira) crassicornis* Jacquelin Duval, 1852

Phyllobius Germar, 1824 (**page 286**)

- * *P. oblongus* (L., 1758)
- * *P. argentatus* (L., 1758)
- * *P. piri* (L., 1758)
- * *P. betulae* (F., 1801)
- * *P. virideaeris* (Laicharting, 1781)
- * *P. parvulus* (Olivier, 1807)
- * *P. calcaratus* (F., 1792)
- * *P. maculicornis* (Germar, 1824)
- * *P. urticae* (DeGeer, 1775)
- * *P. cinerascens* (F., 1792)
- * *P. cloropus* (L., 1758) = *viridicollis*

Omiomima Silfverberg, 1972

- * *O. concinnus* (Boheman, 1834)

Cathormiocerus Schönherr, 1843

- * *C. validiscapus* Rouget, 1857
- * *C. avenionensis* Hustache, 1924

Brachyderinae*Trachyploeus* Germar, 1817

- * *T. alternans* Gyllenhal, 1834
- * *T. spinimanus* Germar, 1824
- * *T. bifoveolatus* (Beck., 1817)
- * *T. angustisetulus* Hansen, 1915

Pachyrhinus Schönherr, 1823 (**page 287**)

- * *P. lethierryi* Desbrochers des Loges, 1875

Polydrusus Germar, 1824

- * *P. (Conocetus) kahri* Kirsch, 1865
- * *P. (Metallites) atomarius* (Olivier, 1807)
- * *P. (M.) marginatus* Stephens, 1831
- * *P. (Tylosus) impressifrons* Gyllenhal, 1834
- * *P. (Thomsoneonymus) sericeus* (Schaller, 1783)
- * *P. (Eustolus) confluens* Stephens, 1831
- * *P. (E.) prasinus* (Olivier, 1790)
- * *P. (E.) cervinus* (L., 1758)
- * *P. (E.) pilosus* Gredler, 1866
- * *P. (Chlorodrosus) abeillei* Desbrochers des Loges, 1869

Pleurodirus Chevrolat, 1872

- * *P. (Pseudometallites) murinus* (Gyllenhal, 1834)

Barypeithes Jacquelin Duval, 1855

- * *B. pellucidus* (Boheman, 1834)
- * *B. montanus* Chevrolat, 1863

Strophomorphus Seidlitz, 1870 (**page 288**)

- * *S. porcellus* (Schönherr, 1832)

Brachyderes Schönherr, 1823

- * *B. (Sulciurus) lusitanicus* (F., 1781)
- * *B. (Brachyderes) incanus* (L., 1758)
- * *B. (B.) pubescens* Boheman, 1833

Strophosoma Billberg, 1820

- * *S. (S.) melanogrammum* (Förster, 1871)
- * *S. (S.) capitatum* (DeGeer, 1775)
- * *S. (Neliocarus) faber* (Herbst, 1784)
- * *S. (N.) nebulosum* Stephens, 1831 = *retusum*

Barynotus Germar, 1817

- * *B. obscurus* (F., 1775)
- * *B. squamosus* Germar, 1824

Geonemus Schönherr, 1834 (**page 289**)

- * *G. flabellipes* (Olivier, 1807)

Tropiphorus Schönherr, 1842

- * *T. tomentosus* (Marsham, 1802)

Liophlaeus Germar, 1817

- * *L. tessulatus* (Müller, 1776)

Sitona Germar, 1817

- * *S. regensteiniensis* (Herbst, 1794)
- * *S. cambricus* Stephens, 1831
- * *S. cinerascens* Fåhræus, 1840
- * *S. tibialis* (Herbst, 1795)
- * *S. lineatus* (L., 1758)
- * *S. intermedius* Küster, 1842
- * *S. lividipes* Fåhræus, 1840
- * *S. gemellatus* Gyllenhal, 1834
- * *S. macularius* (Marsham, 1802)
- * *S. cylindricollis* Fåhræus, 1840
- * *S. discoideus* Gyllenhal, 1834
- * *S. sulcifrons* (Thunberg, 1798)
- * *S. puncticollis* Stephens, 1831
- * *S. flavescens* (Marsham, 1802)
- * *S. hispidulus* (F., 1776)

Tanymecinae*Cycloderes* C. R. Sahlberg, 1823

- * *C. (Aramorius) guinardi* (Jacquelin Duval, 1853)

Tanymecus Schönherr, 1826

- * *T. palliatus* (F., 1787)

Chlorophanus C.R. Sahlberg, 1823 (**page 290**)

- * *C. gibbosus* (Paykull, 1792)

Brachycerinae*Brachycerus* Olivier, 1790

- * *B. undatus* (F., 1798)
- * *B. muricatus* (Olivier, 1790) = *algirus*

Cleoninae

Mecaspis Schönherr, 1826

- * *M. alternans* (Herbst, 1795)

Coniocleonus Motschoulsky, 1860 (**page 291**)

- * *C. nigrosuturatus* (Goeze, 1777)

Chromoderus Motschoulsky, 1860

- * *C. fasciatus* (Müller, 1776)

Leucosomus Motschoulsky, 1860

- [*L. pedestris* (Poda, 1761)]

Pseudocleonus Chevrolat, 1874

- * *P. cinereus* (Schränk, 1781)
- * *P. grammicus* (Panzer, 1789)

Cyphocleonus Motschoulsky, 1860

- * *C. tigrinus* (Panzer, 1789)
- * *C. trisulcatus* (Herbst, 1795)

Pachycerus Schönherr, 1826

- * *P. cordiger* (Germar, 1819) = *scabrosus*

Rabdorrhynchus Motschoulsky, 1860

- * *R. varius* (Herbst, 1795)

Cleonis Dejean, 1821

- * *C. piger* (Scopoli, 1763)

Lixus F., 1801

- * *L. (Eulixus) lateralis* (Panzer, 1793)
- * *L. (Ortholixus) acicularis* Germar, 1824
- * *L. (O.) trivittatus* Capiomont, 1873
- * *L. (Compsolixus) junci* Boheman, 1836
- * *L. (C.) albomarginatus* Boheman, 1843
- * *L. (C.) ochraceus* Boheman, 1843
- * *L. (Lixoglyptus) spartii* Olivier, 1807
- * *L. (Dilixellus) angustatus* (F., 1775) = *algirus*
- * *L. (D.) sanguineus* (Rossi, 1790)
- * *L. (D.) bardanae* (F., 1787)
- * *L. (Lixochelus) scolopax* Boheman, 1836
- * *L. (L.) elongatus* (Goeze, 1777)
- * *L. vilis* (Rossi, 1790)

Larinus Germar, 1824 (**page 292**)

- * *L. vulpes* (Olivier, 1807)
- * *L. ursus* (F., 1792)
- * *L. flavescens* Germar, 1824
- * *L. scolymi* (Olivier, 1808)
- * *L. obtusus* Gyllenhal, 1836 ssp. *australis* Capiomont, 1874
- * *L. turbinatus* Gyllenhal, 1836

- * *L. jaceae* (F., 1775)
- * *L. sturnus* (Schaller, 1783)
- * *L. planus* (F., 1792)
- * *L. longirostris* Gyllenhal, 1836
- * *L. leuzeae* H. Fabre, 1870
- * *L. rugulosus* Petri, 1907

Rhinocyllus Germar, 1819 (**page 293**)

- * *R. conicus* (Frölich, 1792)

Curculioninae

Hypera Germar, 1821

- * *H. zoilus* (Scopoli, 1763)
- [*H. adspersa* (F., 1792)]
- * *H. striata* Boheman, 1834
- * *H. meles* (F., 1792)
- * *H. arator* (L., 1758)
- [*H. elongata* (Paykull, 1800)]
- * *H. suspiciosa* (Herbst, 1795)
- * *H. postica* (Gyllenhal, 1813)
- * *H. venusta* (F., 1781)
- * *H. nigrirostris* (F., 1775)
- * *H. viciae* (Gyllenhal, 1813)
- * *H. maculipennis* Fairmaire, 1859

Donus Jekel, 1864

- * *D. ovalis* (Boheman, 1842)
- * *D. globosus* (Fairmaire, 1858)
- * *D. intermedius* (Boheman, 1842)

Alophus Schönherr, 1826 (**page 294**)

- * *A. triguttatus* (F., 1775)

Lepyrus Germar, 1817

- * *L. palustris* (Scopoli, 1763)

Hylobius Germar, 1817

- * *H. abietis* (L., 1758)

Liparus Olivier, 1807

- * *L. germanus* (L., 1758)
- * *L. coronatus* (Goeze, 1777)

Minyops Schönherr, 1826

- * *M. carinatus* (L., 1767)

Plinthus Germar, 1817

- * *M. findeli* Boheman, 1842

Mitoplinthus Reitter, 1897

- * *E. (Epipolaeus) caliginosus* (F., 1775)

Leiosoma Stephens, 1831 (**page 295**)

- * *L. deflexum* (Panzer, 1795)
- * *L. oblongulum* Boheman, 1842

Echinomorphus Fauvel, 1889

- * *E. ravouxi* (Jacquet, 1888)

Calandrinae

Pissodes Germar, 1817

- * *P. piceae* (Illiger, 1807)
- * *P. notatus* (F., 1787)
- * *P. pini* (L., 1758)

Magdalis Germar, 1817

- * *M. rufa* Germar, 1824
- * *M. phlegmatica* (Herbst, 1797)
- * *M. memnonia* Gyllenhal, 1837
- * *M. linearis* (Gyllenhal, 1827)
- * *M. punctulata* (Mulsant & Rey, 1859)
- * *M. duplicata* Germar, 1819
- * *M. frontalis* (Gyllenhal, 1827)
- * *M. violacea* (L., 1758)
- * *M. exarata* Henri Brisout de Barneville, 1862
- * *M. cerasi* (L., 1758)
- * *M. flavicornis* Gyllenhal, 1836
- * *M. ruficornis* (L., 1758)

Bagous Germar, 1817 (**page 296**)

- [*B. (B.) argillaceus* Gyllenhal, 1836]

Dryophthorus Schönherr, 1826

- * *D. corticalis* (Paykull, 1792)

Mesites Schönherr, 1838

- * *M. cunipes* (Boheman, 1837)

Rhyncolus Germar, 1824

- * *R. (Eremotes) ater* (L., 1758)

Brachytemnus Wollaston, 1873

- * *B. porcatus* (Germar, 1824)

Phloeophagus Schönherr, 1838

- * *P. lignarius* (Marsham, 1802)

Pelenomus P. G. Thomson, 1859

- * *P. (Phytobius) velaris* (Gyllenhal, 1827)
- * *P. (P.) comari* (Herbst, 1795)

Neophytobius Wagner, 1936

- * *N. (Heterophytobius) granatus* (Gyllenhal, 1836)

Rhinoncus Stephens, 1831

- * *R. bruchoides* (Herbst, 1784)
- * *R. pericarpus* (L., 1758)
- * *R. castor* (F., 1792)
- * *R. pericarpus* (L., 1758)

Amalus Schönherr, 1826

- * *A. scortillum* (Herbst, 1795) = *haemorrhous*

Auleutes Dietz, 1896

- * *A. epilobii* (Paykull, 1800)

Micrelus Thomson, 1859

- * *M. ericae* (Gyllenhal, 1813)

Zacladus Reitter, 1913

- * *Z. geranii* (Paykull, 1800) = *affinis*
- * *Z. exiguus* (Olivier, 1807)

Nedys Stephens, 1831

- * *N. (Cidnorhinus) quadrimaculatus* (L., 1758)

Stenocarus Thomson, 1865 (**page 297**)

- * *S. fuliginosus* (Marsham, 1802)

Coeliodes Schönherr, 1837

- * *C. erythroleucos* (Gmelin, 1790) = *cinctus*
- * *C. ruber* (Marsham, 1802)
- * *C. ilicis* (Bedel, 1885)
- * *C. rubicundus* (Herbst, 1795)

Trichosirocalus Colonnelli, 1979 = *Ceutorhynchidius*

- * *T. troglodytes* (F., 1787)
- * *T. horridus* (Panzer, 1801)

Ceutorhynchus Germar, 1824 (**page 297**)

- * *C. (Calosirus) apicalis* (Gyllenhal, 1827)
- * *C. (Sirocalodes) depressicollis* (Gyllenhal, 1813) = *nigrinus*
- [*C. (Neosirocalus) posthumus* Germar, 1824]
- * *C. (N.) floralis* (Paykull, 1792)
- * *C. (C.) geographicus* (Goeze, 1777)
- [*C. (C.) punctiger* Gyllenhal, 1837]
- * *C. (C.) suturalis* (F., 1775)
- * *C. (C.) pleurostigma* (Marsham, 1802)
- * *C. (C.) assimilis* (Paykull, 1792)
- * *C. (C.) nanus* Gyllenhal, 1837
- * *C. (C.) pallidactylus* (Marsham, 1802) = *quadridens*
- * *C. (C.) sulcicollis* (Paykull, 1800)
- * *C. ignitus* Germar, 1824
- [*C. (C.) pandellei* Charles Brisout, 1869]
- [*C. (C.) contractus* (Marsham, 1802)]
- * *C. (C.) hirtulus* Germar, 1824
- * *C. (C.) chalybaeus* Germar, 1824
- * *C. (C.) atomus* Boheman, 1845
- * *C. (C.) asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813)
- * *C. (C.) pollinarius* (Förster, 1771)
- * *C. (C.) napi* Gyllenhal, 1837
- * *C. (C.) resedae* Marsham, 1802
- * *C. (C.) distinctus* Ch. Brisout, 1870 = *marginatus*
- * *C. fulvitaris* Ch. Brisout, 1860
- * *C. maculaalba* (Herbst, 1795)
- * *C. griseus* (Charles Brisout, 1869)

* *C. picitarsis* Gyllenhal, 1837

Orobitis Germar, 1817

* *O. cyaneus* (L., 1758)

Sitophilus Schönherr, 1838 (**page 298**)

* *S. granarius* (L., 1758)

* *S. oryzae* (L., 1763)

Sphenophorus Schönherr, 1838

* *S. abbreviatus* (F., 1787)

* *S. striatopunctatus* (Goeze, 1777)

Baris Germar, 1824

* *B. timida* (Rossi, 1792)

[*B. quadraticollis* Boheman, 1836]

[*B. prasina* (Boheman, 1836)]

* *B. laticollis* (Marsham, 1802)

[*B. fallax* H. Brisout, 1870]

Curculio L., 1758

* *C. elephas* Gyllenhal, 1836

* *C. pellitus* Boheman, 1843

* *C. nukum* L., 1758

* *C. glandium* (Marsham, 1802)

* *C. villosus* (F., 1781)

* *C. venosus* (Gravenhorst, 1807)

-

Balanobius Jekel, 1861 (**page 299**)

* *B. crux* (F., 1776)

* *B. salicivorus* (Paykull, 1792)

* *B. pyrrhoceras* (Marsham, 1802)

Brachonyx Schönherr, 1826

* *B. pineti* (Paykull, 1792)

Furcipes Desbrochers des Loges, 1868

* *F. rectirostris* (L., 1758)

Anthonomus Germar, 1817

* *A. (Anthonomorphus) varians* (Paykull, 1792)

* *A. (A.) rubi* (Herbst, 1795)

* *A. (A.) piri* Kollar, 1837

* *A. (Toplithus) spilotus* Redtenbacher, 1849

* *A. (T.) pedicularis* (L., 1758)

Bradybatus Germar, 1824

* *B. (Nothops) elongatulus* (Boheman, 1843)

Acalyptus Schönherr, 1836

* *A. carpini* (F., 1792)

Ellescus Dejean, 1821

E. bipunctatus (L., 1758)

Sibinia Germar, 1824

- * *S. sodalis* Germar, 1824
- * *S. pellucens* (Scopoli, 1772)
- * *S. potentillae* Germar, 1824
- * *S. variata* (Gyllenhal, 1836)
- * *S. viscaria* (L., 1761)

Tychius Germar, 1817 (**page 300**)

- * *T. elegantulus* Charles Brisout, 1862
- * *T. venustus* (F., 1781)
- * *T. cinnamomeus* Kiesenwetter, 1851
- [*T. aureolus* Kiesenwetter, 1851]
- * *T. flavicollis* Stephens, 1831
- * *T. medicaginis* Charles Brisout, 1863
- * *T. pusillus* Germar, 1842
- * *T. tibialis* Boheman, 1843
- * *T. stephensi* Gyllenhal, 1836 = *tomentosus*
- * *T. schneideri* (Herbst, 1795)
- * *T. funicularis* Charles Brisout, 1862
- * *T. breviusculus* Desbrochers des Loges, 1873 = *haematopus*

Miccotrogus Schönherr, 1826

- * *M. picirostris* (F., 1787)
- * *M. cuprifer* (Panzer, 1799)

Lignyodes Dejean, 1835

- * *L. enucleator* (Panzer, 1798)

Cionus Clairville, 1798

- * *C. hortulanus* (Geoffroy, 1785)
- * *C. longicollis* Charles Brisout, 1863
- * *C. olivieri* Rosenschoeld, 1838
- * *C. thapsus* (F., 1792)
- * *C. nigratarsis* Reitter, 1904
- * *C. olens* (F., 1792)
- * *C. tuberculosus* (Scopoli, 1763)
- * *C. schoenherri* Charles Brisout, 1863

Stereonychus Suffrian, 1854

- * *S. fraxini* (DeGeer, 1775)

Nanophyes Schönherr, 1838

- * *N. (N.) marmoratus* (Goeze, 1777)
- * *N. (N.) brevis* Boheman, 1845
- [*N. (N.) globiformis* Kiesenwetter, 1864]
- * *N. (N.) helveticus* Tournier, 1867
- * *N. flavidus* Aubé, 1850

Nanodiscus Kiesenwetter, 1864 (**page 301**)

- * *N. transversus* (Aubé, 1850)

Mecinus Germar, 1821

- * *M. longiusculus* Boheman, 1845
- * *M. sicardi* Hustache, 1920

- * *M. pyraster* (Herbst, 1795)
- * *M. janthinus* (Germar, 1817)

Gymnetron Schönherr, 1826

- * *G. (G.) veronicae* (Germar, 1821)
- * *G. (G.) pascuorum* (Gyllenhal, 1813)
- * *G. (G.) variabile* Rosenhauer, 1856
- * *G. (G.) rostellum* (Herbst, 1795)
- * *G. (G.) latiusculum* Jacquelin Duval, 1855
- * *G. (G.) seriatum* Jacquet, 1888
- * *G. (Rhinusa) asellus* (Gravenhorst, 1807)
- * *G. (R.) netum* (Germar, 1821)
- * *G. (R.) tetrum* (F., 1792)
- * *G. (R.) antirrhini* (Paykull, 1800)
- * *G. (R.) bipustulatum* (Rossi, 1794)
- * *G. (R.) linariae* (Panzer, 1792)

Miarus Schönherr, 1826

- * *M. meridionalis* (Henri Brisout, 1862)
- * *M. longirostris* (Gyllenhal, 1838)
- * *M. distinctus* (Boheman, 1845)
- * *M. graminis* (Gyllenhal, 1813)
- * *M. campanulae* (L., 1767)
- * *M. micros* (Germar, 1821)
- * *M. meridionalis* (Henri Brisout, 1862)
- * *M. plantarum* (Germar, 1824)

Rhynchaenus Clairville & Schellenberg, 1798 = *Orchestes*

- * *R. pilosus* (F., 1781)
- * *R. fagi* (L., 1758)
- * *R. testaceus* (Müller, 1776)
- * *R. avellanae* (Donovan, 1797)
- * *R. salicis* (L., 1758)
- * *R. decoratus* (Germar, 1821)
- * *R. stigma* (Germar, 1821)
- * *R. pseudostigma* Tempère, 1982
- * *R. quercus* (L., 1758)
- * *R. irroratus* Kiesenwetter, 1851
- * *R. sparsus* (Fåhræus, 1843)
- * *R. erythropus* (Germar, 1821)
- * *R. lonicerae* (Herbst, 1795)

Rhamphus Clairville, 1798 (**page 302**)

- * *R. subaeneus* (Illiger, 1807)
- * *R. pulicarius* (Herbst, 1795)

Acalles Schönherr, 1826

- * *A. roboris* Curtis, 1834
- * *A. pyrenaeus* Boheman, 1844
- * *A. humerosus* Fairmaire, 1862
- * *A. ptinoides* (Marsham, 1802)
- * *A. lemur* (Germar, 1824)

Echinodera Wollaston, 1864

- * *E. (Rutera) hypocrita* (Boheman, 1837)

Smicronyx Schönherr, 1843

- * *S. (S.) nebulosus* Tournier, 1874
- * *S. (S.) brevicornis* Solari, 1952
- * *S. reichi* (Gyllenhal, 1836)
- * *S. coecus* (Reich, 1797)

Acentrus Schönherr, 1845

- * *A. histrio* Boheman, 1845

Pachytychius Jekel, 1861

- * *P. sparsutus* (Olivier, 1807)
- * *P. squamosus* (Gyllenhal, 1836)
- * *P. haematocephalus* (Gyllenhal, 1835)

Dorytomus Germar, 1817 (**page 303**)

- * *D. (D.) longimanus* (Förster, 1771)
- * *D. (D.) filirostris* (Gyllenhal, 1836)
- * *D. (D.) ictor* (Herbst, 1795) = *validirostris*
- * *D. (D.) tremulae* (Paykull, 1800)
- * *D. (Paradorytomus) melanophthalmus* (Paykull, 1792)
- * *D. schoenherri* Faust, 1882
- * *D. tortrix* (L., 1761)

Orthochaetes Germar, 1824

- * *O. (O.) setiger* (Beck, 1817)

Apionidae (pages 303 à 307)

Omphalapion Schilsky, 1901

- * *O. hookerorum* (Kirby, 1808)

Ceratapion Schilsky, 1901

- * *C. (Acanephodus) onopordi* (Kirby, 1808)
- * *C. (C.) carduorum* (Kirby, 1808)
- * *C. (Diplapion) confluens* (Kirby, 1808)
- * *C. (D.) detritum* (Mulsant & Rey, 1859)
- * *C. (Echinostroma) penetrans* (Germar, 1817)
- * *C. (E.) scalptum* (Mulsant & Rey, 1858)

Aspidapion Schilsky, 1901

- * *A. (A.) radiolus* (Marsham, 1802)
- * *A. (Koestlinia) aeneum* (F., 1775)

Melanapion Wagner, 1930

- * *M. (M.) minimum* (Herbst, 1797)

Squamapion Bokor, 1923

- * *S. minutissimum* (Rosenhauer, 1856)
- * *S. atomarium* (Kirby, 1808)
- * *S. hoffmanni* (Wagner, 1930)
- * *S. oblivium* (Schilsky, 1902)

Kalcapion Schilsky, 1906

- * *T. semivittatum* (Gyllenhal, 1833)

Taeniapion Schilsky, 1906

- * *T. urticarium* (Herbst, 1784)

- * *T. rufescens* Gyllenhal, 1833

Pseudapion Schilsky, 1906

- * *P. (P.) rufirostre* (F., 1775)
- * *P. (Malvapion) malvae* (F., 1775)
- * *P. (Rhopalapion) longirostre* (Olivier, 1807)

Lepidapion Schilsky, 1906

- * *L. (L.) squamigerum* (Jacquelin Duval, 1855)

Exapion Bedel, 1887

- * *E. (E.) fuscirostre* (F., 1775)
- * *E. (E.) compactum* (Desbrochers des Loges, 1888)
- * *E. (E.) fasciolatum* (Wagner, 1912) = *heikertingeri*
- * *E. (E.) genistae* (Kirby, 1808)

Protapion Schilsky, 1908

- * *P. (P.) filirostre* (Kirby, 1808)
- * *P. (P.) nigritarse* (Kirby, 1808)
- * *P. (P.) difforme* (Germar, 1818)
- * *P. (P.) apricans* Herbst, 1797
- * *P. (P.) assimile* (Kirby, 1808)
- * *P. (P.) ononidis* (Gyllenhal, 1827) = *ononicola*
- * *P. (P.) interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895)
- * *P. (P.) ruficroides* (Schatzmayer, 1926)
- * *P. (P.) laevicollis* (Kirby, 1811)
- * *P. (P.) trifolii* (L., 1768)
- * *P. (P.) schoenherri* (Boheman, 1839)
- * *P. (P.) varipes* (Germar, 1817)
- * *P. (P.) fulvipes* (Fourcroy, 1785) = *flavipes*
- * *P. (Pseudoprotapion) elegantulum* (Germar, 1818)
- * *P. (P.) astragali* (Paykull, 1800)

Phrissotrichum Schilsky, 1901

- * *P. (Helianthemapion) aciculare* (Germar, 1817)
- * *P. (P.) tubiferum* (Gyllenhal, 1833)
- * *P. (Schilskyapion) rugicollis* (Germar, 1817)

Pseudostenapion Wagner, 1930

- * *P. simum* (Germar, 1817)

Aizobius Alonso Zarazaga, 1991

- * *A. sedi* Germar, 1818

Perapion Wagner, 1907

- * *P. (P.) violaceum* (Kirby, 1808)
- * *P. (P.) curtirostre* (Germar, 1817)
- * *P. (P.) affine* (Kirby, 1808)
- [*P. (P.) marchicum* (Herbst, 1797)]

Apion Herbst, 1797

- * *A. frumentarium* (L., 1758) = *miniaturum* = *sanguineum*
- * *A. cruentatum* Walton, 1844
- * *A. rubens* Walton, 1844

Betulapion Ehret, 1994

- * *B. simile* (Kirby, 1811)

Oxystoma Duméril, 1806

- * *O. (Apiops) pisi* (F., 1801)
- * *O. (Bothryorhynchapion) afer* (Gyllenhal, 1833)
- * *O. (Catapion) seniculus* (Kirby, 1808)
- * *O. (C.) pubescens* (Kirby, 1811)
- * *O. (C.) curtulum* (Desbrochers des Loges, 1870)
- * *O. (Chlorapion) virens* (Herbst, 1797)
- * *O. (Cnemapion) vorax* (Herbst, 1797)
- * *O. (Cyanapion) columbinum* (Germar, 1817)
- * *O. (Eutrichapion) melancholicum* (Wencker, 1864)
- * *O. (E.) viciae* (Paykull, 1800)
- * *O. (E.) ervi* (Kirby, 1808)
- * *O. (Hemitrichapion) reflexum* (Gyllenhal, 1833)
- * *O. (H.) waltoni* (Stephens, 1839) = *curtisi*
- * *O. (H.) pavidum* (Germar, 1817)
- * *O. (Holotrichapion) ononis* Kirby, 1808
- * *O. (Ischnopterapion) fallens* (Marseul, 1888)
- [*O. (I.) loti* (Kirby, 1808)]
- * *O. (I.) modestum* (Germar, 1817)
- * *O. (Legaricapion) aethiops* (Herbst, 1797)
- [*O. (Oryxolaemus) flavifemoratum* (Herbst, 1797)]
- * *O. (O.) cracca* (L., 1767)
- * *O. (O.) pomonae* (F., 1798)
- * *O. (O.) subulatum* (Kirby, 1808)
- * *O. (O.) cerdo* (Gerstäcker, 1854)
- * *O. (Pirapion) immune* (Kirby, 1808)
- * *O. (Protopirapion) atratum* (Germar, 1817) = *striatum*
- * *O. (Psilocalymma) facetum* (Gyllenhal, 1839)
- * *O. (P.) punctigerum* (Paykull, 1792)
- * *O. (Stenopterapion) tenue* (Kirby, 1808)
- * *O. (S.) intermedium* (Eppelsheim, 1875)

Rhynchitidae

Attelabus L., 1758 (**page 307**)

- * *A. nitens* (Scopoli, 1763)

Bytiscus Thomson, 1859

- * *B. betulae* (L., 1758)

Deporaus Leach in Samouelle, 1819

- * *D. betulae* (L., 1758)

Rhynchites Schneider, 1791

- * *R. (R.) giganteus* Krynicki, 1832
- * *R. (R.) bacchus* (L., 1758)
- * *R. (R.) auratus* (Scopoli, 1763)
- * *R. (R.) caeruleus* (DeGeer, 1775)
- * *R. (Involvulus) pubescens* (F., 1775)
- * *R. (Euvolvulus) cupreus* (L., 1758)

Caenorhinus Thomson, 1859

- * *C. germanicus* (Herbst, 1797)
- * *C. aeneovirens* (Marsham, 1802)

* *C. aequatus* (L., 1767)

Lasiorhynchites Jekel, 1860 (**page 308**)

* *L. caeruleocephalus* (Schaller, 1783)

* *L. sericeus* (Herbst, 1797)

* *L. cavifrons* (Gyllenhal, 1833)

* *L. praeustus* (Boheman, 1845)

Pselaphorhynchites Schilsky, 1903

* *P. nanus* (Paykull, 1792)

Nemonychidae

Nemonyx Redtenbacher, 1845

* *N. lepturoides* (F., 1801)

Rhinomacer F., 1787

* *R. attelaboides* F., 1787

Doydirhynchus Dejean, 1821

* *D. austriacus* (Olivier, 1807)

Scolytidae (= Aipidae@)

Scolytus Müller, 1764

* *S. (S.) mali* Bechstein, 1805

* *S. (Rugulososcolytus) rugulosus* Ratzeburg, 1837

Hylesinus F., 1801

[*H. crenatus* F., 1787]

Leperesinus Reitter, 1913

* *L. fraxini* (F., 1799)

* *L. orni* (Fuchs, 1906)

Hylastinus Bedel, 1888

* *H. obscurus* (Marshall, 1802)

Phloeotribus Latreille, 1796

* *P. scarabaeoides* (Bernard, 1788)

Phloeophthorus Wollaston, 1854

* *R. rhododactylus* (Marshall, 1802)

Phloeosinus Chapuis, 1863 (**page 309**)

* *P. thujae* (Perris, 1860)

* *P. bicolor* (Brullé, 1832)

Hylurgops Le Conte, 1876

* *H. glabratus* (Zetterstedt, 1828)

* *H. palliatus* (Gyllenhal, 1813)

Hylastes Erichson, 1836

* *H. ater* (Paykull, 1800)

* *H. cunicularius* Erichson, 1836

- * *H. opacus* Erichson, 1836
- * *H. attenuatus* Erichson, 1836

Dendroctonus Erichson, 1836
 * *D. micans* (Kugelann, 1794)

Blastophagus Eichhoff, 1864
 * *B. minor* (Hartig, 1834)
 * *B. piniperda* (L., 1758)

Hylurgus Latreille, 1807
 * *H. ligniperda* (F., 1792)

Polygraphus Erichson, 1836
 * *P. grandiclava* Thomson, 1886

Carphoborus Eichhoff, 1864
 * *C. minimus* (F., 1801)

Hypoborus Erichson, 1836
 * *H. ficus* Erichson, 1836

Estenoborus Reitter, 1913
 * *E. perrisi* (Chapuis, 1873)

Crypturgus Erichson, 1836
 * *C. pusillus* (Gyllenhal, 1813)

Thamnurgus Eichhoff, 1864
 [*T. characiae* Eichhoff, 1881]
 * *T. variipes* Eichhoff, 1878

Dryocoetes Eichhoff, 1864
 * *D. autographus* (Ratzeburg, 1837)

Xylocleptes Ferrari, 1867
 * *X. bispinus* (Duftschmid, 1825)

Dryocoetinus Balachowsky, 1949
 * *D. villosus* (F., 1792)

Taphrorychus Eichhoff, 1879 (**page 310**)
 * *T. villifrons* (Léon Dufour, 1843)

Xyloterus Erichson, 1836
 * *X. lineatus* (Olivier, 1795)

Cryphalus Erichson, 1836
 * *C. piceae* Ratzeburg, 1837

Anisandrus Ferrari, 1867
 * *A. dispar* (F., 1792)

Xyleborus Eichhoff, 1864
 * *X. saxeseni* (Ratzeburg, 1837)

* *X. dryographus* (Ratzeburg, 1837)

* *X. monographus* (F., 1792)

Pityophthorus Eichhoff, 1864

* *P. buyssoni* Reitter, 1901

Gnathotrichus Eichhoff, 1866

* *G. materarius* (Fitch., 1858)

Pityogenes Bedel, 1888

* *P. (P.) chalcographus* (L., 1761)

* *P. (Pityoceragenes) bidentatus* (Herbst, 1783)

* *P. (P.) quadridens* (Hartig, 1834)

Ips DeGeer, 1775

* *I. sexdentatus* (Boerner, 1776)

* *I. typographus* (L., 1758)

Pityokteines Fuchs, 1911

* *P. spinidens* (Reitter, 1894)

Orthotomicus Ferrari, 1867

* *O. laricis* (F., 1792)

* *O. erosus* (Wollaston, 1857)

BIBLIOGRAPHIE SUR LES COLÉOPTÈRES DE L'ARDÈCHE

ABERLENC H.-P., 1987. – Coléoptères de l'Ardèche. Premier supplément à l'inventaire de J. Balazuc (1984). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 56 (10) : 320-349.

ABERLENC H.-P., 1996. – Coléoptères de l'Ardèche. Second supplément à l'inventaire de J. Balazuc (1984). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 65 (4) : 113-152.

BALAZUC J., 1984. – Coléoptères de l'Ardèche. Contribution à l'inventaire d'une faune régionale. *Supplément au Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 53, 366 p.

DODELIN B. & LESEIGNEUR L., 2010. – Nouvelles observations de *Cerophytum elateroides* (Latreille) en région Rhône-Alpes (Coleoptera Cerphytidae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 79 (9-10) : 267-270.

GOUVERNEUR X. & GUERARD P., 2007. – Présence d'un rare coléoptère Buprestidae dans l'agglomération rennaise (Ille-et-Vilaine) : *Agrilus (Anambus) auricollis* Kiesenwetter, 1857. *Rutilans*, 10 (3) : 83-85.

LESEIGNEUR L., CHARLAT S. & ALLEMAND R., 2010. – Réhabilitation de *Athous puncticollis* Kiesenwetter, 1858, espèce distincte de *A. vittatus* Fabricius, 1792 (Coleoptera, Elateridae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 115 (3) : 381-385.

Publications et documents consultés pour la nomenclature :**Généralités :**

MARTINEZ M. & GAUVRIT B., 1997. – Combien y a-t-il d'espèces d'insectes en France ? *Bulletin de la Société entomologique de France*, 102 (4) : 319-332.

FaunaEur

Catalogue des Coléoptères Paléarctiques

Apionidae :

EHRET J.-M., 1990. – Les Apions de France : clés d'identification commentées (Coleoptera Curculionidae Apioninae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 59 (7) : 209-292.

EHRET J.-M., 1995. – Les Apions de France. Liste systématique et distribution (Coleoptera Curculionidae Apioninae). *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun*, 157 : 29-38.

Buprestidae :

CURLETTI G., 1994. – *I Buprestidi d'Italia*. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia, Monografie di Natura Bresciana, N° 19, 318 pp.

Caraboidea :

Supplément au Jeannel, collection Faune de France (à paraître).

Cerambycidae :

Cocquemot C., 2009. – Les Coléoptères Cerambycidae du département du Gard (France). Bilan des connaissances. *Rutilans*, 12 (3) : 3-62.

Chrysomelidae :

BOURDONNE J.-C., sept. 1997. – Liste des espèces de la Faune de France (*manuscrit en traitement de texte*).

DOGUET S., 1994. – *Coléoptères Chrysomelidae, Volume 2 : Alticinae*. Paris, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France (80) : 694 p.

Coccinellidae :

DUVERGER C., 1998 – Liste des Coccinellidae de France (*manuscrit*).

Curculionidae :

TEMPERE G. & Péricart J., 1989. – *Coléoptères Curculionidae*. Paris, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France (4^e partie), 536 p.

Histeridae :

SECQ M., 1996. – Coléoptères Histeridae de l'Ardèche (*liste dactylographiée*).

GOMY Y. & Secq M., 199 ? – Catalogue abrégé des Histeridae de France. *L'Entomologiste*.

Scarabaeoidea :

BARAUD J., 1992. – *Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe*. Paris, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles et Société linnéenne de Lyon, Faune de France (78), 872 p.

Silphidae :

DEBREUIL, M., 2010. – Présence en France dans les Alpes-maritimes de *Nicrophorus sepulchralis* Heer, 1841 et complément à l'étude des Nicrophorinae Heer, 1841 (Coleoptera, Silphidae, Nicrophorinae). *Rutilans*, 13 (2) : 47-51

Tenebrionidae :

SOLDATI L. & F., 1998. – Catalogue des Coléoptères Tenebrionidae de France

SOLDATI L. & F., 1995. – Les Tenebrionidae de l'Hérault (Coleoptera). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 100 (3) : 261-275.